

李氏東垣十書

2
Dr. Lee Tung Woon's
Methods of Treating
Disease. Copy of a
14th Century work in
Chinese.

Shanghai. 1906.

[C.] Vol. II

蘭室秘藏目錄

卷上

飲食勞倦門

飲食所傷論

勞倦所傷論

調中益氣湯

交泰丸

木香乾薑枳木丸

和中丸

消積滯集香丸

黃氏當歸湯

益智和中丸

脾胃虛損論

三黃枳木丸

白木丸

中滿腹脹門

寬中喜食無厭丸

木香人參生薑枳木丸

扶脾丸

檳榔丸

黃氏湯

參朮湯

益胃散

巴豆三稜丸

草豆蔻丸

中滿腹脹論

諸腹脹大皆屬於執論

中滿分消丸

廣茂清堅湯

破滯氣湯

心腹痞門

消痞丸

黃連消痞丸

葶應丸

胃脘痛門

草豆蔻丸

麻黃豆蔻丸

酒客病論

葛花解醒湯

半夏枳朮丸

除濕益氣丸

中滿分消湯

半夏厚朴湯

草豆蔻湯

失笑丸

消痞湯

神聖復氣丸

枳朮丸

橘皮枳朮丸

除濕散

升麻黃連丸

上二黃丸

瓜蒂散

消渴門

消渴論

和血益氣湯

當歸潤燥湯

生津甘露湯

辛潤緩肌湯

甘草石膏湯

甘露膏

生津甘露飲子

眼耳鼻門

諸脉者皆屬於目論

內障眼論

芎辛湯

碧天丸

廣大重明湯

百點膏

選奇湯

神効明目湯

羌活退翳膏

明目細辛湯

復明散

助陽和血湯

吹雲膏

防風飲子

撥雲湯

神効黃氏湯

圓明內障升麻湯

黃芩黃連湯

蔓荊子湯

歸葵湯

救苦湯

熟乾地黄丸

益陰腎氣丸

羌活退翳丸

當歸龍膽湯

補陽湯

瀉陰火丸

升陽柴胡湯

溫衛湯

圓明膏

嚙藥麻黃散

療本滋腎丸

加味滋腎丸

退翳膏

龍膽飲子

柴胡聰耳湯

羌活退翳湯

還睛紫金丹

麗澤通氣湯

溫肺湯

禦寒湯

頭痛門

頭痛論

清空膏

徹清膏

川芎散

白芷散

碧雲散

羌活清空膏

清上瀉火湯

補氣湯

細辛散

羌活湯

養神湯

安神湯

半夏白朮天麻湯

口齒咽喉門

口齒論

羌活散

單豆蔻散

麻黃散

麝香散

治蟲散

益智木律散

蠟稍散

白牙散

刷牙藥

獨聖散

當歸龍膽散

牢牙地黃散

細辛散

立効散

牢牙散

清胃散

神功丸

桔梗湯又方

神驗法

嘔吐門

丁香茱萸湯

白朮湯

補肝湯

吳茱萸丸

衄血吐血門

麥門冬飲子

人參飲子

麻黃桂枝湯

黃芪芍藥湯

三黃補血湯

救肺湯

止衄血法

腰痛門

川羌肉桂湯

獨活湯

破血散疼湯

地龍散

蒼朮湯

麻黃復煎散

緩筋湯

拈痛湯

蒼朮復煎湯

羌活蒼朮湯

婦人門

經閉不行有三論

經漏不止有三論

升陽除濕湯

涼血地黃湯

酒煮當歸丸

固真丸

烏藥湯

助陽湯

水府丹

丁香膠艾湯

黃芪當歸人參湯

當歸芍藥湯

柴胡調經湯

益胃升陽湯

升陽舉經湯

半產候用寒涼之藥論

全生活血湯

當歸附子湯

調經補真湯

坐樂龍鹽膏

勝陰丹

迴陽丹

柴胡丁香湯

延胡苦練湯

桂附湯

人參補氣湯

黃氏白朮湯

白朮茯苓湯

增味四物湯

補經固真湯

溫衛補血湯

立効散

四聖散

溫經除濕湯

補氣升陽和中湯

麻黃桂枝升麻湯

卷下

大便結燥門

大便結燥論

通幽湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽湯

活血潤燥丸

潤腸湯

小便淋閉門

小便淋閉論

通關丸

導氣除濕湯

清肺飲子

腎疸湯

痔漏門

痔漏論

秦光白朮丸

秦光蒼朮湯

七聖丸

秦光防風湯

秦光羌活湯

當歸郁李仁湯

紅花桃仁湯

秦光當歸湯

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

龍膽瀉肝湯

清震湯

固真湯

清魂湯

椒粉散

補肝湯

溫腎湯

延胡丁香丸

瀉痢門

訶子皮散

升麻補胃湯

升陽去熱和血湯

益智和中湯

芍藥煨皮丸

和中益胃湯

槐花散

茯苓湯

黃芪補胃湯

升陽除濕湯

人參益胃湯

升麻補胃湯

瘡瘍門

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

救苦化堅湯

柴胡連翹湯

黍粘子湯

淨液湯

消腫湯

內托羗活湯

升麻托裏湯

內托黃芪湯

柴胡通經湯

白芷升麻湯

保生救苦散

一上散

聖愈湯

獨聖散

黃氏肉桂柴胡酒煎湯

雜病門

安神丸

硃砂安神丸

補氣湯

當歸補血湯

柴胡升麻湯

火鬱湯

小黃丸

黃芩利膈丸

補益腎肝丸

太陽經嚏藥

麻黃柴胡湯

黃氏湯

除濕補氣湯

參歸湯

升陽湯

自汗門

自汗論

調衛湯

清燥湯

當歸六黃湯

紅豆散

活血通經湯

瀉榮湯

人參益氣湯

導氣湯

補中湯

麻黃蒼朮湯

上清湯

木桂湯

正氣湯

越痛丸

退熱湯

解表升麻湯

天麻黃芪湯

健步丸

白朮除濕湯

加味四君子湯

瀉血湯

洗面藥

瑩肌如玉散

面油摩風膏

小兒門

治驚論

黃芪湯

益黃散

升陽益血湯

厚腸丸

補陽湯

大黃蘗湯

壅氣退黃湯

中滿分消丸

消痞丸

癰疹論

消毒救苦散

黍粘子湯

桔梗湯

麻黃紫胡升麻湯



東垣老人 李杲 撰

明新安 吳勉學 校

飲食勞倦門

飲食所傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之氣也因而不飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則為喘咳為腫滿為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積為滿者是花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脉橫解腸辟為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸辟當分寒熱輕重而治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑三稜廣木巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘖黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽論云應象在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七凡毒治病不可過之此聖人之深戒也

勞倦所傷論

調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣熏胸中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱無氣以動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之是也金匱要略云平人脉大為勞脉極虛亦為勞者矣夫勞之為病其脉浮大手足煩熱春夏劇秋冬差脉大者熱也極虛者氣損也春夏以黃芪建中湯治之此亦溫之之意也夫上古聖人飲食有節起居有常不妄作勞形與神俱百歲乃去此謂治未病也今時之人去聖人久遠則不然飲食失節起居失宜妄作勞役形氣俱傷故病而後藥之是治其已病也推其百病之源皆因飲食勞倦而胃氣元氣散解不能滋榮百脉灌溉臟腑衛護周身之所致也故蒼天之氣貴清靜陽氣惡煩勞噫飲食喜怒之間寒暑起居之際可不慎歟

調中益氣湯

治因飢飽勞役損傷脾胃元氣不足其脉弦洪緩而沉按之中之下得時一澀其證四肢

滿悶肢節疼痛難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味腹難舒伸大小便清利

而數或上飲下便澀滯或夏月餐泄米穀不化或便後見血或便見白膿胸滿短氣咽隔不通

痰唾稠粘口中沫沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安卧不思飲

食並皆治之

橘皮

如腹中氣不轉運加木香一分如無此證不加

黃蘗

酒洗已上各二分

升麻

此一本為上氣不足胃氣與脾氣下流乃補上氣從陰引陽

柴胡

已上各三

分
人參有數者 炙甘草 蒼朮五上各 黃芪一錢

如時顯躁躁是下元陰火蒸蒸然發也加生地黃二分 黃藥三分

如大便虛坐不得或大便秘了而不了腹中常常逼迫皆是血虛血澀加當歸身三分 無此證則去之

如身體沉重雖小便數多亦加茯苓二 黃藥三分 澤瀉五分 蒼朮錢 時暫從權而去濕也不可常用兼足太陰

已病且脉亦終於心中故顯濕熱相合而生煩亂

如胃氣不和加湯洗半夏五分 薑片三分 有嗽者加生薑生地黃分 以製半夏之毒

如痰厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾邪所作也

如兼躁熱加黃藥生地黃各二分

如無已上證只服前藥

右件判如麻豆大都作一服水二大盞煎去粗稍熱食遠服之甯心絕慮靜坐少語藥必為効耳

如夏月須加白芍藥三分

如春月腹中痛尤宜加

如惡熱而渴或腹痛者更加芍藥五分 黃芩二分

如惡寒腹痛加中桂分 去黃芩謂之桂枝芍藥湯亦於前藥中加之

如冬月腹痛不可用芍藥蓋大寒之藥也口加乾薑分 或加半夏五分 宜以生薑少許製之

如秋冬之月胃脉四道為衝脉所逆脇下少陽脉二道而反上行名曰厥逆且證氣上衝咽不得息而喘

息有音不得卧加吳茱萸五分至一錢酒洗去節觀厥氣多少而用之亦於前藥中作一服服之

如夏月有此證為大熱也此病隨四時為寒熱溫涼也宜以黃連酒洗黃蘗酒洗知母酒洗已上各等分右

為細末熟湯為丸如梧桐子大每服一百丸或二百丸白湯送下空心服仍多飲熟湯服畢少時使以

美食壓之使不令胃中停留直至下元以瀉衝脉之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損證

也常宜以甘溫平之甘多辛少是且治也

實中喜食無厭丸一名寬中進食丸資形氣喜飲食

木香五分青皮 人參 乾生薑以上各一錢炙甘草一分白茯苓 澤瀉 橘皮

白朮已上各二錢縮砂仁 猪苓已上各二錢五分枳實四錢草豆蔻仁五錢神曲五錢五分

半夏七錢大麥蘖麵炒一兩右為細末湯浸餛餅為丸如梧桐子大每服三五十丸米湯下食遠

交泰丸 升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠惰嗜卧四肢沉困不收

乾薑已製三分巴豆霜五分人參去節肉桂去皮已上各一錢柴胡去油小椒炒去汗子并開目白朮已上各一錢五分

厚朴去皮炒三錢白茯苓 苦練酒洗縮砂仁已上各二錢知母酒洗錢一半酒炒一半川烏已製

去皮秋加七錢吳茱萸湯洗七錢皂角水洗去皮紫苑去油已上各六錢黃連去心錢五分右除巴豆

霜別研外同為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九丸溫水送下食遠虛實加減

木香人參生薑枳木丸 開胃進飲食

乾生薑二錢五分木香三錢人參五錢陳皮四錢枳實一兩白朮一兩右為細末何葉裹燒飯

為丸如梧桐子大每服三五十九溫水下食前

木香乾薑和米丸 破除寒滯氣消寒飲食

木香錢三 乾薑五錢 枳實一兩 白木一兩

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服三

五十九溫水送下食前

扶脾丸 治脾胃虛寒腹中痛漉瀉無度飲食不化

乾生薑 肉桂已上各五分 乾薑 霍香 紅豆已上各錢 白朮 茯苓 橘皮 半

夏 訶子皮 炙甘草 烏梅肉已上各錢 大麥藥炒 神麴已上各四錢 右為細末荷葉燒

飯為丸如梧桐子大每服五十九白湯送下食前

和中丸 補胃進食

人參 乾生薑 陳皮已上各錢 乾木瓜錢二 炙甘草錢三 右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐

子大每服五十九白湯送下食前

檳榔丸 破滯氣消飲食

炙甘草錢一 木香 人參 檳榔已上各錢 陳皮錢五 右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大

每服五十九白湯下食前

消積滯集香丸 治傷生冷硬物不消

京三稜 廣茂 青皮 陳皮 丁香皮 益智 川練子 茴香已上各 巴

豆和梗米炒

右為細末醋糊為丸如菜豆大每服五七丸溫水送下食前服

黃芪湯補胃除濕和血益血滋養元氣

木香氣通去之

霍香葉已上各

當歸酒洗

陳皮已上各

人參

澤瀉已上各

黃芪兩

右咬

咀每服五錢水二大盞煎至一盞如欲汗加生薑煎食遠熱服之

黃芪當歸湯治熱上攻頭目沿身胸背發熱

當歸身一錢酒洗

黃芪五錢

右咬咀作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

參朮湯治脾胃虛弱元氣不足四肢沉重食後昏悶

黃蘗酒浸

當歸已上各

柴胡

升麻已上各

人參

陳皮

青皮已上各

神麴末七

炙甘草已上各

蒼朮一錢

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠服

益智和中丸李杲合

木香

黃連

生地黃已上各

黃芪

人參

麥門冬

神麴末

當歸身

乾生薑

陳皮

姜黃已上各

縮砂仁已上各

桂花一錢

桂枝五錢

益智仁已上各

炙甘草

麥麴麵二錢五分

草豆蔻仁四錢

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五十九丸白湯下

細嚼亦當

益胃散治因服寒藥過多以致脾胃虛損胃脘疼痛

人參

甘草

縮砂仁

厚朴已上各

白豆蔻

姜黃

乾生薑

澤瀉已上各

益智仁

黃芪

陳皮七片

右為粗末每服三錢水二盞生薑五片煎至一盞去粗食前

溫服

脾胃虛損論

易水張先生常戒不可峻利食禁下咽未至藥丸施化其標皮之力始開便言快也所傷之物已去若更待一兩時辰許藥盡化開其藥峻利必有情性病去之後脾胃既損是真氣元氣敗壞促人之壽當時設下一藥枳實一兩炒黃色為度白朮二兩只此二味荷葉裹燒飯為丸以白朮焙溫甘溫補脾胃之元氣其古味除胃中之濕熱利腰膈間血故先補脾胃之弱過於枳實化之藥一倍枳實味苦寒泄心下之痞悶消化胃中所傷此一藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許食則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣當是之時未悟用荷葉燒飯為丸之理老年味之始得可謂神矣荷葉之物中央空象震卦之體震者動也人感之生足少陽甲膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法便是少陽元人之飲食入胃營氣上行即少陽甲膽之氣也膽也甲其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法便是少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水土之下出於污穢之中不染提其獨立其色青形乃空青而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不上升乎其主意用此一味為引用可謂達識深慮合於道者也更以燒飯和藥與白朮協力滋養殺氣補令胃厚再不至內傷且利膈生大毒右內傷脾胃辛熱之物酒肉之類目覺不快竟藥於醫醫者亦不問所傷付之集杏丸小丁香丸巴豆大熱藥之類下之使下則物去遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣則七神

不熾經云熱傷氣正謂此也其人必無氣以動而四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人真氣自此衰矣若傷生冷硬物世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之隨藥所傷去矣遺留胃之寒性藥之寒性重瀉且陽陽去則皮膚筋肉血脈無所依倚便為虛損之證論言反此今人寒心夫辛辣厚味之藥無故不可亂服非止牽牛而已至真要大論云五味入胃各先還其所喜攻者尅伐瀉也辛味下咽先攻瀉肺之五氣氣者真氣元氣也且牽牛之辛辣猛烈傷人尤甚飲食所傷腸胃受邪當以苦泄其腸胃可也肺與元氣何罪之有用牽牛大罪有五此其一也况胃主血所生病為物所傷物者有形之物也皆是瀉其氣且罪二也且飲食傷之於中焦止合剋化消導其食重瀉上焦肺中已虛之氣其罪三也食傷腸胃當寒因寒用又曰寒因寒用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉真氣大禁四也殊不知鍼經有云外來客邪風寒傷人五臟若候瀉胃氣必死候補亦死其死也無氣以動故靜若內傷腸胃而反瀉五臟必死候補亦死其死也陰氣有餘故躁今內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無神氣肺者五臟之一數也雖不即死若更旬日之間必暗損人壽數謂如人壽應百歲為牽牛之類朝損暮損其元氣消耗不得終其天年但人不覺耳將為天年已盡此乃暗裏折人壽數大禁五也論并方庶令四海聞而行之不至天橫耳此夫之用心也胃氣不可不養復明養胃之理內經云安穀者昌絕穀者亡水則榮散穀消則亡榮散衛亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脉道乃行故血不可不養胃不可不溫血養胃溫榮衛將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟修奉養五臟者也內傷飲食固非細事苟妄服食藥而輕生殞命其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜

清冷大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯曰調此者食飲衣服亦欲適寒溫寒無悞悞暑無汗
飲食者熱無灼灼寒無淒淒寒溫中適故氣將舒不致和僻也是必有因用豈可用俱寒俱熱之藥乎
致損與以刃殺人者何異內經說內傷者其氣口脉反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有
脉下部無脉且人常吐不吐者死如但食不納惡心欲吐者不問一倍二倍不當正與瓜蒂散吐之但以
指或以物探去之若所傷之物去不盡者更診其脉問其所傷以食藥去之以應塞因塞用又謂之寒因
泄而下降乃應大泄之用其中更加升發之藥令其元氣上升塞因通用因曲而為其何為曲內傷胃氣
是也何為直因而升發胃氣是也因其飲食之內傷而使生氣增益胃氣完復此乃因曲而為之直也若
分經用藥其所傷之物寒熱溫涼生硬柔軟所傷不一難之定一法口隨所傷之物不同各立治法臨時
加減用之其用藥又當問病人從來稟氣盛衰所傷寒物熱物是喜食而耶不可服破氣藥若乘飢困而
食之耶當益胃氣或為人所勉勸強食之宜損血而益氣也診其脉候傷在何臟可與對病之藥豈可妄
瀉天真元氣以輕喪身寶乎且如先食熱物而不傷繼之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問
熱食寒食孰多孰少斟酌與藥無不當矣喻如傷熱物二分寒物一分則當用寒藥二分熱藥一分相合
而與之則榮衛之氣必得周流或有或先飲酒而後傷寒冷之食及傷熱食冷水與水如此不等皆當驗
其節次所傷之物酌量寒熱之劑分數各各對證與之無不取效自付所定藥方未敢便謂能盡性之理
姑用指迷辯惑耳

三黃枳朮丸 治傷肉濕麵辛辣味厚之物填塞悶亂不快

枳實錢五

黃連去酒洗

大黃濕紙

神麴炒

橘皮

白朮已上各

黃芩兩

右為極細末

湯浸餅為丸如棗豆一倍大每服五十九白湯下臨時量所傷多少加減服之

巴豆三稜丸一名木香

治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜分五

木香錢二

升麻

柴胡已上各

草豆蔻麵末

香附子炒已上

神麴炒黃

石三稜根去皮

京三稜根已上

右為細末湯浸餅為丸如棗豆一倍大每服一二十丸溫白湯

下量所傷多少加減服之

白朮丸 治傷豆粉濕麵油膩之物

白礬細三

黃芩錢五

橘皮錢七

神麴炒黃

半夏湯洗

白朮已上各

枳實麵炒黃

右為

極細末湯浸餅為丸如棗豆大每服三五十九白湯下素食多用乾薑故加黃芩以瀉之

草豆蔻丸 治秋冬傷寒食物胃脘當心而痛上支兩脇咽膈不通

炒鹽分五

乾生薑

青皮

橘皮已上各

麥麴麵炒黃

生黃芩冬月

半夏湯洗

神麴

各五錢

草豆蔻麵末

白朮已上各

枳實麵炒

右為極細末湯浸餅為丸如棗豆大

每服五十九白湯下

中滿腹脹門

中滿腹脹論

六元政紀論云太陰所至為中滿太陰所至為滿諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰曰濕土

之化脾濕有餘腹滿食不化天為陽為熱主運化也地為陰為濕主長養也無陽則陰不能生化故云臟寒生滿病調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃如受熱中未傳寒中皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿腹脹支脇脇下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經所謂胃中寒則脹滿者是也鍼經三卷雜病第八腹滿大便秘不利上走胸脇喘息噎噎然取足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽寒水為脹與通評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募也正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛熱散之以若瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如開鬼門潔淨府溫衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其真經氣血乎陽布神清此治之正也或曰諸脹腹大皆屬於熱者何也此乃病機總辭假令外傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變為熱而作胃實腹滿仲景以太承氣湯治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而成脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辨之

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外而入是感風寒之邪傳裏寒變為熱作胃實日晡潮濕大渴引飲讖語是太陽陽明并大實大滿者大承氣下之少陽陽明微滿實者小承氣下之世之則脹已此之謂也假令痰瘕為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕而瘕病作矣知其寒也局方用艾解飲子者是也內虛不足寒濕令人中滿及五臟六腑俱有脹滿更以脉家寒熱多少較之胃中寒則脹滿濁氣在上則生腹脹脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也正同腹滿腹脹支脇脇下厥上冒過在太陰陽明胃中寒濕鬱遏

也太陰脾脹復不利不欲食食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其濕下焦如膏氣血自然分化不待泄澤穢如滿大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麵及味厚之物膏粱之人或食已便卧使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分消丸主之

如或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或感寒生滿病以治寒脹中滿分消湯主之

中滿分消丸 治中滿熱脹鼓脹氣脹水脹此非寒脹類

白朮 人參 炙甘草 猪苓去黑皮 姜黃已上各一錢 白茯苓去皮 乾生薑 砂仁已上各一錢

澤瀉 橘皮已上各三錢 知母炒四錢 黃芩去腐炒夏用一兩二錢 黃連炒淨 半夏湯洗七次 枳實炒已上各五錢

厚朴薑製一兩 右除茯苓澤瀉生薑外共為極細末入上三味和勻湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服

一百丸焙熱白湯下食遠服量病人大小加減

中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通膝踠足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下

痞下焦躁寒沉厥奔豚不收

川烏 澤瀉 黃連 人參 青皮 當歸 生薑 麻黃 柴胡 乾薑

華澄茄已上各二分 益智仁 半夏 茯苓 木香 升麻已上各二分 黃芪 吳茱萸

厚朴 草豆蔻仁 黃蘗已上各五分 右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞食前熱服

忌房室酒濕麵生冷及油膩等物

廣茂潰堅湯 治中滿腹脹內有積聚堅硬如石其形如盤人不能坐卧大小便澀滯上喘氣促面色
痿黃通身虛腫

廣茂 紅花 升麻 吳茱萸二分各 生甘草 柴胡 澤瀉 神麴 青皮

陳皮三分各 厚朴生用 黃芩 黃連 益智仁 單豆蔻仁 當歸稍五分 半夏

如渴加 葛根四分 右劉如麻豆大水二大盞煎至一盞稍熱服食遠忌酒醋濕麵服二服之

後中滿減半止有積不消再服後藥

半夏厚朴湯

紅花 蘇木半斤各 吳茱萸 乾生薑 黃連一分各 木香 青皮二分各 肉桂

蒼朮 白茯苓 澤瀉 柴胡 陳皮 生黃芩 單豆蔻仁 生甘草三分各

京三稜 當歸稍 猪苓 升麻四分各 神麴六分 厚朴八分 半夏一錢 桃仁七箇 昆布

如渴加 葛根三分 右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服此藥二服之後前證又減

一半却於前藥中加減服之

破滯氣湯名木香化滯散 破滯氣治心腹滿悶

炙甘草四分 白檀 霍香 陳皮 大腹子 白豆蔻仁 白茯苓 桔梗五分各

砂仁 人參 青皮 檳榔 木香 姜黃 白朮二錢已上各 右咬咀每服二錢水

二盞煎至一盞去粗溫服不拘時

草豆蔻湯 治腹中虛脹

澤瀉一分

木香三分

神麴四分

半夏製

枳實

草豆蔻仁

黃氏春夏去之

益智

甘草已

各五

青皮

陳皮已

茯苓

當歸已

右為粗末都作一服水二大盞生薑三

片煎至一盞去粗溫服冬月加黃氏五七分春夏止服止藥食達

心腹痞悶

消痞丸 治心下痞悶一切所傷及積年不愈者

乾生薑

神麴炒

炙甘草已

猪苓已

澤瀉

厚朴

砂仁已

半夏湯洗

陳皮

人參已

枳實五錢

黃連炒

黃芩已

姜黃

白朮已

右為細末

湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五七十九至百丸白湯送下食遠服

失笑丸一名枳實消痞丸

治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食

乾生薑

炙甘草

麥蘖麴

白茯苓

白朮已

半夏製

人參已

厚朴四錢

枳實

黃連已

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五七十九白湯

下食遠服

黃連消痞丸

治心下痞滿滯滯不散煩熱端促不安

澤瀉

姜黃已

乾生薑

炙甘草

茯苓

白朮已

陳皮五錢

各五

枳實炒

半夏已

黃連兩

黃芩炒

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服

五十九丸溫湯下食遠

消痞丸一名木香 治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食

枳實炒 當歸稍二分 陳皮 生薑 木香三分 柴胡四分 草豆蔻 炙甘草五分

半夏錢一 紅花許少 右為粗末作一服水二盞生薑三片煎至一盞食遠服忌酒濕麵

導痰丸一名人參 治心下痞胸中不利

半夏洗 厚朴炙 石膏 青皮五分 當歸身 白豆蔻仁 縮砂 茵陳酒

乾葛一錢 炙甘草 羌活 黃芩一半 酒洗 芒葶酒洗 人參 柴胡 獨活

三錢 右為細末湯浸餅和勻篩子內擦如米大每服二錢臨卧用一口湯下

胃脘痛門

草豆蔻丸 治脾胃虛弱而心大寒之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致

肺金大腸相輔而來尅心乘脾胃此大復讎也經云大勝必大復理之常也故皮毛血脉分肉之間元

氣已絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒

腦痛大惡風寒目時眩不欲開腹中為寒水反乘痰唾沫沫食則反出腹中常痛心胃作痛脇下縮急

有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腹中鳴此脾胃虛之至極也胸中氣亂心煩不安

而為霍亂之漸咽膈不通極則咽塞有聲喘喝閉塞或於日陽處或於暖室中少緩口吸風寒之氣則

復作四肢厥冷身體沉重不能轉側頭不可以回顧小便澀而時躁此藥主之秋冬寒涼大復氣之藥

也

神麴末

柴胡詳腸下痛多少用之

姜黃已上各四分

當歸身

青皮已上各六分

黃芪

人參

益

智仁

吳茱萸湯洗

陳皮

白僵蠶已上各一分

澤瀉小梗數

半夏已上各一分

甘草生六分

來藥一錢五分炒

草豆蔻仁麵裹燒熟為度一錢四分

桃仁七箇湯浸去皮尖

右除桃仁別研如泥餘為細末同研

勻湯浸餅為丸如梧桐子大每服五七十丸白湯下食遠服

神聖復氣湯 治復氣乘冬陽太陽寒水足少陰腎水之旺子能令母實手太陰肺腎反來尅土火木受

和腰背胸膈閉塞疼痛善噎口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或如息肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如

火下寒如冰頭作陣痛目中流火視物眵眵耳聾耳鳴頭并口鼻大惡風寒喜日晴暖夜卧不安常覺

痰塞咽膈不通口不知味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物脘腹之間及尻脅足膝不時寒冷前陰

冷而多汗行步欹側起居艱難麻木風痺小便數氣短喘喝少氣不足以息遺失無度及婦人白帶陰

戶中大痛牽心而痛面色驚黑男子控辜痛牽心腹或面色如赭食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏

急腹不能努或腸鳴膝下筋急肩脾太痛此皆寒水來復火土之鋒也

乾薑炮

黑附子炮已上各三分

防風

人參

郁李仁另研已上各五分

當歸身酒洗六分

半夏湯洗

升麻已上各七分

藁本

甘草已上各八分

柴胡

羌活已上各一錢

白葵花五朵去心剪碎

右件都作一

服水五大盞煎至一盞入黃芪一錢橘紅五分草豆蔻仁一錢麴裏煨熟去皮一錢同煎至一盞再

入下項藥黃芪三分酒浸黃連三分酒浸枳殼三分生地黃三分酒洗此四味預一日另用新水浸

又以華細辛二分川芎細末三分蔓荊子三分作一處浸此三味并黃蘗等煎正藥作一大盞不去粗入此所浸之藥再上火同煎至一大盞去粗執服空心又能治齒頰齧唇舌舌根強硬等證如神忌肉湯宜食肉不助經絡中火邪也大抵腎元鹽膀胱經中有寒氣不足者并宜服之於月生月滿時食隔三五日一服如病急不拘時候

麻黃豆蔻丸 治客寒犯胃心胃大痛不可忍

木香 青皮 紅花 厚朴各二分 蘇木三分 華澄加四分 升麻 半夏湯洗 麥藥麵

縮砂仁 黃芪 白朮 陳皮各去白 柴胡 炙甘草 吳茱萸 當歸身各五分

益智仁八分 神麴末二錢 麻黃下去節三錢 草豆蔻仁五錢 右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大

每服五十丸白湯下或細嚼湯下亦可

酒傷病論

論酒大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之則止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消且濕何酒病之有今之酒病者往往服酒癰丸大熱之藥下之又用牽牛大黃下之是無形元氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之况亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神何依折人長命雖不即死而虛損之病成矣金匱要略云酒疸下之久久為黑疸慎不可犯此戒不若令上下分消其濕當以葛花解醒湯主之

葛花解醒湯

木香五分

人參去節

猪苓去黑皮

白茯苓

橘皮已上各一分

白朮

乾生薑

神麴炒

澤瀉已上各二錢

蓮花青皮三錢

縮砂仁

白豆蔻仁

葛花已上各五錢

右為極細末和勻每服

三錢七白湯調下但得微汗酒病去矣此蓋不得已而用豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損人天命

枳朮丸 治痞消食強胃

枳實炒黃

白朮二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菡豆一倍大每服五十九白湯下不拘

時候量所傷多少加減服之

半夏枳朮丸 治因冷物內傷

半夏湯洗七次一兩

枳實炒黃

右三味為極細末荷葉裹燒飯為丸如菡豆一倍大每服五十九白

湯下量所傷加減服之

橘皮枳朮丸 治元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

橘皮

枳實炒黃

白朮二兩

右為極細末荷葉裹燒飯為丸如菡豆一倍大每服五十

丸白湯下量所傷加減服之

除濕益氣丸 治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

紅花三分

蘿蔔子炒熟

枳實炒黃

黃芩生用

神麴炒黃

白朮已上各一兩

右同為

細末荷葉裏燒飯為丸如菉豆一倍大每服五十丸白湯下量所傷加減服之

除濕散 治傷馬奶子并半羊酪水一切冷物

甘草

紅花已上各二錢

半夏湯洗七次

乾生薑已上各三錢

車前子

澤瀉已上各五錢

茯苓

神麴炒黃色一兩

右為極細末每服三錢白湯調下食前

升麻黃連丸

治多食肉口臭不欲聞且穢惡氣使左右不得近

白檀

生甘草三錢

生薑取目然汁

蓮花青皮

升麻已上各五錢

黃連去脂一兩

黃芩

去酒酒

右為細末湯浸餅為丸如彈子大每服一丸細嚼白湯下食後

上二黃丸 治傷熱食痞悶元元欲吐煩亂不安

甘草

升麻

柴胡已上各三錢

黃連酒洗一兩

黃芩二兩

一方加

枳實五錢

右為細末

湯浸餅為丸如菉豆大每服五十丸白湯下食遠

治傷冷飲者以五苓散每服二錢三錢七加生薑煎服之

治傷食熱湯冷飲者煎五苓散送半夏枳木丸

治傷冷飲不忌寒者腹中亦不覺寒惟覺悶身重食不化者或小便利煎去桂五苓散依前斟酌服之

瓜蒂散 上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂也下部無脉此謂木鬱也飲食過飽填塞胸中

胸中者太陰之分野經曰氣口大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱則達之吐者是也

瓜蒂

赤小豆已上各等分

右二味為極細末每服二錢七溫漿水調下取吐為度右不至兩手尺

脉絕無不宜使用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止是胸中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥吐之解云盛食填塞於胸中為之窒塞兩寸脉當主事兩尺脉不見其理妄安在胸中有食故以吐出之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胸中者肺也為物所填肺者手太陰金也金生殺伐也與坤土俱在於上而旺於天金能剋木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣食塞於上脉絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故曰獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長矣地之用在於天上則萬物收藏矣此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之原本於天上故曰水出高原故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脉主之偏見於寸口食塞其上是絕五臟之源源絕則水不下流兩尺竭絕此其理也何疑之有假令所傷前後不同以分為率傷熱物二分傷生冷硬物一分用寒藥三黃丸二停熱藥巴豆三稜丸一停合而服之如熱物傷少而寒物傷多則寒藥少而熱藥多也假令夏月大熱之時傷生冷硬物當用熱藥巴豆三稜丸治之須加三黃丸謂天時不可伐故加寒藥以順時令若熱物則用三黃丸何謂此三黃丸時藥也假令冬大寒之時傷羊肉大麵等熱物當用三黃丸治之須加熱藥少許草豆蔻丸之類是也為引用又為時藥經云必先歲氣無伐天和和之謂也餘皆微此

消渴門

消渴論

陰陽別論云二陽結謂之消脉要精微論云癰成謂消中夫二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足陽明胃主血熱則消穀善飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣標悍能助燥熱也越人云邪在土腑則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉盛矣陽脉大盛則陰氣不得營也故皮膚肌肉消削是也經云凡治消痺什繫偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也岐伯曰脉實病久可治脉弦小病久不可治後分為三消消者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳為膈消者是也是以白虎加人參湯治之中消者善食而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾饒飲水多虛癰成消中者是也以調胃承氣三黃丸治之下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味地黃丸治之總錄所謂未傳能食者必發癰疽疔瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆謂不治之證潔古老人分而治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏方白朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣前人用樂厥有言哉或曰未傳瘡疽者何也此大邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死未傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更其道也痰膩膈有達近心肺位近宜制小且服腎肝位達宜制大且服皆適且至所為故如過與不及皆誅罰無過之地也如腸消中消制之太急速過病所久而成中滿之病正謂上熱未除中寒復消者也非藥之罪矣其緩急之制也處方之制宜加意焉

和血益氣湯 治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾燥生肌肉

柴胡 炙甘草 生甘草 此味治口乾舌乾也 麻黃根 三上各 酒當歸 稍四 酒知母

酒浸防己 羌活 五上各 石膏 六分治小 酒生地黃 分 酒黃連 八分治舌上赤脉也

酒黃蘗 升麻 已上各 杏仁 桃仁 已上各 紅花 許 右咬咀都作一服水二大盞

煎至一盞去粗溫服忌熱濕麵酒醋等物

當歸潤燥湯 治消渴大便閉澀乾燥結硬憂喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處身浮雲

細辛 分 生甘草 炙甘草 熟地黃 以上各 柴胡 分 黃蘗 知母 石膏

桃仁 泥 當歸身 麻子仁 防風 荊芥穗 已上各 升麻 一錢 紅花 許

杏仁 六 小椒 三 右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗執服食遠忌辛熱物

生津甘露湯 治消中能食而瘦口舌乾目汗大便秘燥小便頻數

升麻 分四 防風 生甘草 漢防己 生地黃 已上各 當歸身 分 柴胡

羌活 炙甘草 黃芪 酒知母 酒黃芩 已上各 酒龍膽草 石膏 黃蘗

已上各一錢五分 紅花 許 桃仁 五 杏仁 十 右咬咀都作一服水二盞酒一匙煎至一盞稍

執服食遠

辛潤緩肌湯 一名清神備氣湯 前消渴證纔愈上有口乾腹不能多此藥主之

生地黃 細辛 已上各 熟地黃 分三 石膏 分四 黃蘗 酒 黃連 製 生甘草

知母五上各

柴胡七分

當歸身

荊芥穗

桃仁

防風七上各

升麻五上各

紅花許少

杏仁六上各

小椒兩

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞食遠稍熟服之

甘草石膏湯

渴病久愈又添古白沫微腫咽嚥津作痛噎腫時有渴喜飲口中白沫如膠

生地黃

細辛一上各

熟地黃

黃連三上各

甘草五分

石膏六上各

柴胡七分

黃蘗

知母

當歸身

桃仁炒去

荊芥穗

防風七上各

升麻五上各

紅花許少

杏仁六上各

小椒兩

右如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食後溫服

甘露膏一名蘭香飲子

治消渴飲水極甚善食而瘦目汗大便結燥小便頻數

半夏二分

熟甘草

白豆蔻仁

人參

蘭香

升麻

連翹

桔梗五上各

生甘草

防風七上各

酒知母五上各

石膏三上各

右為極細末湯浸餅和勻成劑捻作

薄片子日中晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後

生津甘露飲子 治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有腹脹或瀉黃如麋名曰餐泄渾身

色黃目睛黃甚四肢痿弱前陰如水尻髀腰背寒面生蠶色腸下急痛善噫喜怒健忘

霍香二分

柴胡

黃連

木香三上各

白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香五上各

絡五

華澄茄

生甘草

山梔子

白豆蔻仁

白芷

連翹

姜黃一上各

石膏二錢

杏仁去

酒黃蘗一上各

炙甘草

酒知母

升麻

人參二上各

桔梗三錢

全蝎兩

右為細末湯浸餅和勻成劑捻作片子日中晒半乾擦碎如黃米大母

服二錢津唾下或白湯送下食遠服

眼耳鼻門

諸脉者皆屬於目論

陰陽應象論云諸脉皆屬於目目得血而能視五臟六腑精氣皆上注於目而為之精精之窠則為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精則為約束裹攢筋骨血氣之精而與脉并為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則即隨眼系入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也則精散精散則視岐故見兩物目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所主也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼發於陰白眼赤脉發於陽故陰陽合傳而為精明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也夫十二經脉三百六十五絡其血氣皆上走於面而走空竅其清陽氣上散於目而為精其氣走於耳而為聽因心事煩冗飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大盛則百脉沸騰血脉逆行邪害至竅天明則日月不明矣夫五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目者血脉之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代行且令相火者包絡也主百脉皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所并而損血脉故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也

肉障眼論

凡心包絡之脉出於心中以代心君之行事也與少陽為表裏腫子散大者少陰心之脉挾目系厥陰肝之脉連目系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦宜酸宜涼大忌辛辣熱物以助木火之邪也飲食中常知此理可也夫辛主散熱則助火故不可食諸酸主收心氣瀉木火也諸苦瀉火熱則益水也尤忌食冷水大寒之物此則能損胃氣胃氣不行則元氣不生元氣不則生胃氣下流胸中三焦之火及心火乘於肺上入腦灼髓火主散溢腫子開大大熱之物又助火邪此蓋不可食驗也藥中去芩附子以味辛反主益睛辛者是助火也故去之乃加黃芩黃連瀉中焦之火芩能瀉上焦肺中之火以酒洗之乃寒因熱用也又去青箱子以助陽火也加五味子以收瞳人開大且火之與氣勢不兩立故內經曰壯火食氣氣食少火少火生氣壯火散氣諸酸之物能助元氣孫真人云五月常服五味助五臟氣以補西方肺金經云以酸補之以辛瀉之辛瀉氣則明矣或曰藥中有當歸其味亦辛而甘其不去者何此辛甘一味以其和血之聖藥況有甘味又欲以為鄉導為諸藥之使耳

芎辛湯 治兩眼晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而痛

細辛二分

芎藭

蔓荊子二分

甘草

白芷

已上各一錢

防風一錢五分

右咬咀都作

一服水二盞煎至一盞臨卧溫服

碧天丸一名井珠丸

治日疾累服寒涼藥不愈兩眼蒸熱如火之熏赤而不痛滿目紅絲血脉青睛昏悶昏

暗羞明畏日或上下臉赤爛或冒風沙而內外皆破洗之神効

枯白礬二分

銅碌七分

瓦粉炒黑兩

右先研白礬銅碌令細旋旋入粉同研勻熟水和之

共為一百丸每用一丸熱湯半盞浸一二箇時辰洗至覺微濕為度合眼半時辰許臨卧更洗之瞑目便睡一丸可洗十遍再用湯內坐令熱此藥治其標若裏實者不宜用

廣大重明湯 治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉痒痛抓之至破眼弦生瘡目多眵淚隱澀難開

龍膽草 防風 生甘草 細辛已上各一錢 右剉如咀內甘草不對口作一錠先以水一大

碗半煎龍膽一味至一半再入餘三味煎至少半碗濾去粗用清汁帶熱洗以重湯坐令熱日用五

七次但洗畢合眼一時去努肉之長及痒亦驗

百點膏 張濟氏眼病醫六年以至遮瞳人視物不明有雲氣之狀因用此藥而効

麤仁去皮尖三分 當歸身 甘草已上各六分 防風 黃連揀至二錢剉如麻豆大水一大盞煎至一半入藥 右件

剉如麻豆大麤仁別研如泥同煎滴在水中不散入去沫蜜少許再熬少時為度令病人心靜點之

至目中微痛日用五七次臨卧點尤疾効名之曰百點膏但欲多點使藥力相繼也

選奇湯 治眉痛不可以忍

多甘草鍾用 羌活 防風已上各三錢 酒黃芩一錢冬月不用此一味如能食熱痛倍加之 右咬咀每服五錢

水二盞煎至一盞去粗食後服之

神効明目湯 治眼樓緊急致倒睫拳毛及上下臉皆赤同睛疼昏暗晝則冷淚常流夜則眼澀難開

細辛二分 蔓荊子五分 防風一錢 葛根一錢五分 甘草二錢 一方加黃芪一錢 右咬咀作

一服水二盞煎至一盞去粗稍熱臨卧服之

羌活退賢膏一名便 治足太陰寒水膜子遮睛白瞖在上視物不明

椒樹東南根二分 西北根二分 藁本 漢防己己上各二分 黃連 防風 麻黃去根 柴胡

升麻 生地黃己上各三分 生甘草四分 當歸身一分 羌活七分 梨仁六分 右用淨水一

大碗先用漢防己黃連生甘草當歸身生地黃煎至一半下餘藥再煎至一盞去粗入銀石器中再熬之有力為度

明目細辛湯 治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成紐眵糊多隱澀難開眉攢腫悶鼻塞涕

唾稠粘大便微硬

川芎五分 生地黃酒製 蔓荊子己上各六分 當歸稍 白茯苓 藁本己上各一分 荊芥

二錢 防風二錢 麻黃根 羌活己上各三錢 細辛少許 紅花少許 椒八錢 桃仁二十箇

右咬咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍臨臥熱服之忌酒醋濕麵

復明散 治內障

青皮三分 橘皮 川芎 蒼朮己上各五分 炙甘草 生地黃 連翹 柴胡己上

錢 黃芪一錢五分 當歸身二錢 右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之

食後忌酒醋麵辛熱大料物之類

助陽和血湯 治眼發之後微有上熱白睛紅隱澀難開睡多眵淚

蔓荊子二分 香白芷三分 柴胡 黃芪 炙甘草 當歸身酒洗 防風己上各五分

升麻分七 右吹咀都作一服水一盞半煎至八分去粗稍熟服臨卧避風寒處睡

吹雲膏 治眼中淚及迎風寒泣羞明畏日常欲閉目喜在暗室塞其戶牖腎膜歲久遮睛此藥點之神驗

細辛分一 升麻 麤仁已上各三分 青皮 連翹 防風已上各四分 柴胡分五 生甘

草 當歸身已上各六分 荆芥穗一錢微取濃汁 生地黃一錢五分 揀黃連三錢 右吹咀除連翹外

用澄清淨水二碗先熬餘藥至半碗入連翹同熬至一大盞許去粗入銀石器內文武火熬滴水

成珠不散為度入煉去沫熟蜜少許熬勻用之

防風飲子 治倒睫拳毛

細辛 蔓荊子已上各三分 葛根 防風已上各五分 當歸身七分半 炙甘草 黃連

人參已上各一錢 右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞食遠服避風寒

撥雲湯 戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳兩箇隱難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸

脉細緊按之洪大無力知足太陽膀胱為命門相火煎熬逆行作寒水腎及寒膜遮睛證呵欠善悲健

忘嚏噴眵淚時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠上而喘

黃芪分一 細辛 生薑 葛根 川芎已上各五分 柴胡分七 荆芥穗 藁本

生甘草 升麻 當歸身 知母已上各五錢 羌活 防風 黃蘗已上各一錢五分 右吹

咀都如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去粗執服食後

神功黃氏湯 治渾身麻木不仁或頭面手足肘背或腿脚麻木不仁並皆治之如兩目緊急縮小及羞明畏日隱難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少精光或目中熱如火服五六次可効

蔓荊子

錢一

陳皮

錢五

人參

錢八

炙甘草

白芍藥

錢一

黃氏

錢二

右咬咀每

服五錢水二

盞煎至一盞去粗臨卧稍熱服

如小便淋澀加澤瀉五分一服去則止

如有大熱證每服加酒洗黃蘗三分

如麻木不仁雖有熱不用黃蘗止加黃氏一兩通三兩也

如眼縮急去芍藥忌酒醋麵大料物葱韭蒜辛物

如麻木甚者加芍藥一兩通用二兩

圓明內障升麻湯一名中和養胃湯

治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛飲食不節形體勞役心

不得休息故上為此疾

乾薑

錢一

五味子

錢二

白茯苓

錢三

防風

錢五

白芍藥

錢六

柴胡

錢七

人參

炙甘草

錢一

當歸身

錢一

白朮

錢一

升麻

錢一

葛根

已上各一兩

黃氏

錢一

羌活

已上各一兩

右

咬咀每服五七錢水三大盞煎至二大盞入黃芩黃連二錢同煎數沸去粗煎至一盞熱服食遠

黃芩黃連湯

黃芩

酒洗

黃連

酒洗

龍膽草

酒洗四次

生地黃

酒洗已上各一兩

右咬咀每服二錢水二

薑煎至一盞去粗執服

蔓荊子湯 治勞役飲食不節內障眼病此方如神效

蔓荊子 二錢五分

黃蘗 酒拌炒四遍

白芍藥 三錢上各

炙甘草 八錢

黃芪

人參 已上各兩

右咬咀每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去粗臨卧溫服

歸蔡湯 一名連翹飲子

治目中溜火惡日與火隱澀難開小角緊視物昏化迎風有淚

柴胡 二分

生甘草

蔓荊子

連翹

生地黃

當歸身

紅榮花

人參 已上各三

分 黃芪

酒黃苓

防風

羌活 已上各五分

升麻 一錢

右咬咀每服五錢水二盞煎

至一盞去粗食後溫服

救苦湯 治眼暴發赤腫臉高苦疼不任者

桔梗

連翹

紅花

細辛 已上各一分

當歸身 夏月減半

炙甘草 已上各五分

蒼朮

草龍膽 已上各七分

羌活 太陽

升麻 明陽

柴胡 少陽

防風

藁本

黃連 已上各一錢

生地黃

黃蘗

黃苓

知母 已上各錢五分

川芎 三錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞

去粗食後溫服

若苦疼則多用苦寒者兼治本經之藥再行加減如睛昏加知母黃蘗一倍

熟乾地黃丸

治血弱陰虛不能養心致

旺陽火甚瞳子散大少陰為火君主無為不行其令相火代

之兼心包絡之脉出心系分為三道少陽相火之體無形其用在其中矣火盛則令母實乙木肝旺是

也心之脉挾於目系肝連目系况手足少陽之脉同出耳中至耳上角斜起於目外眦風熱之盛亦從
此道而來上攻頭目致偏頭腫悶瞳子散大視物則花此由血虛陰弱故也法當養血涼血益血收火
之散大除風之熱則愈矣

人參錢二

炙甘草

天門冬湯洗去心

地骨皮

五味子

枳殼炒

黃連已上各錢三

當歸身酒洗焙乾

黃芩已上各錢五

生地黃酒洗七錢分五

柴胡錢八

熟乾地黃兩一

右件同為細

末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸茶湯送下食後日進二服

益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯苓已上各錢五分

生地黃酒洗乾

牡丹皮

山茱萸

當歸酒洗

五味子

乾山藥

柴胡已上各錢五

熟地黃兩二

右為細蜜煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十

丸淡鹽湯下空心

羌活退腎丸

治內障右眼小眚青白腎大眚微顯白腎腦痛瞳子散大上熱惡熱大便秘澀小便如常

遇天氣暄熱頭痛睛脹可服此藥腎在大眚加葛根升麻腎在小眚加柴胡羌活是也

黑附子炮

寒水石已上各錢一

酒防己錢二

知母炒酒

牡丹皮

羌活

川芎已上各錢三

酒黃蘗

生地黃酒洗炒

丹參

芫蔚子

酒當歸身

柴胡已上各錢五

熟地黃錢八

芍藥一兩三錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九白湯下空心宿食未消待饑則服之

藥後省語言以食厭之

當歸龍膽湯 治眼中白翳

防風 石膏已上各一錢五分

柴胡 羌活

五味子

升麻已上各二錢

甘草

酒黃

連 黃芪已上各三錢

酒黃芪炒

酒黃芪炒

當歸身洗酒

草龍膽洗酒

芍藥已上各五錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗入酒少許臨卧熱服忘言語

補陽湯 治陽不勝其陰乃陰勝陽虛則九數不通令青白賢見於大眚乃足太陽少陰經中鬱遏足厥

陰肝經氣不得上通於目故青白賢內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上行

此乃先補其陽後於是太陽太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽

虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨卧服瀉陰丸若天色

變經大寒大風并勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不可服待體氣和平天氣如常服之先補

其陽使陽氣上升通於肝經之末利空數於目矣

肉桂一錢去皮

知母炒

當歸身洗酒

生地黃炒酒

白茯苓

澤瀉

陳皮已上各三錢

白芍藥

防風已上各五錢

黃芪

人參

白朮

羌活

獨活

熟地黃

甘草已上各一兩

柴胡二兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗空心服之

瀉陰火丸一名連藥益陰丸

石決明三錢炒存性

羌活

獨活

甘草

當歸稍

五味子

防風已上各五錢

草決明

細黃芪

黃連炒酒

黃蘗

知母已上各一兩

右為細末煉蜜為丸如棗豆大每

服五十丸至一百丸茶清下常服補陽湯少服此藥多則妨飲食
升陽柴胡湯

肉桂五分

柴胡去節一錢五分

知母酒炒如大者加作五錢

防風

白茯苓

澤瀉

陳皮已上各一錢

生地黃酒炒

楮實酒炒微潤

黃芪

人參

白朮已上各一錢

甘草梢

當歸身

羌活

熟地黃

獨活

白芍藥已上各一兩

右到每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服

別合一料煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸茶清下每日與前藥各一服食遠不可飽服

如天氣熱加五味子三錢天門冬去心芍藥楮實已上各五錢

溫衛湯 治鼻不聞香鼻目中流火氣寒血熱冷淚多臍下冷陰汗足痿弱

陳皮

青皮

黃連

木香已上各三分

人參

炙甘草

白芷

防風

黃蘗

澤瀉已上各五分

黃芪

蒼朮

升麻

知母

柴胡

羌活已上各一錢

當歸身一錢五分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之

圓明膏 治勞心過度飲食失節乃生內障及腫子散大此方收睛圓明

訶子皮濕紙裹煨

甘草已上各一錢

當歸身三錢

柴胡

生地黃

麻黃去節搗開

黃連已上

各五錢

右七味先以水二碗煎麻黃至一碗掠去沫外六味各咬咀如豆大篩去末入在內同煎滴

水中不敢為度入熟蜜少許再熬動點眼

噙藥麻黃散

治內外障眼

麻黃兩一 當歸身錢一 右二味同為粗末炒黑色入麝香乳香少許共為細末含水鼻內噴之

療本滋腎丸 黃蘗酒炒 知母酒炒已上各等分 右為細末滴水為丸如梧桐子大每服一百丸至一百五十丸空心

鹽白湯下 加味滋腎丸

肉桂三分 黃連錢一 姜黃錢五分 苦參錢三 苦葶酒洗 石膏覺肚冷勿用 黃蘗酒炒

知母酒炒已上各五錢 右為極細末打薄麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心服白湯下食鹽之

退賢膏 治黑白腎 麩仁 升麻已上各三分 連翹 防風 青皮已上各四分 甘草 柴胡已上各五分

當歸身六分 荊芥穗十錢水半盞別浸 生地黃錢五分 黃連錢三 右用水一碗入煎藥煎至半碗

去粗更上火煎至半盞入荊芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之

龍膽飲子 治疳眼流膿生疳腎濕熱為病 穀精草 川鬱金 蛇退皮 炙甘草已上各五分 麻黃錢一 升麻錢二 青蛤粉

草龍膽 黃芩炒 羌活已上各三錢 右為細末每服二錢食後溫茶清調服之

柴胡聰耳湯 治耳中乾結耳鳴耳聾 連翹四錢 柴胡錢三 炙甘草 當歸身 人參已上各錢 水蛭五錢研 麝香少許研

連翹四錢 柴胡錢三 炙甘草 當歸身 人參已上各錢 水蛭五錢研 麝香少許研

連翹四錢 柴胡錢三 炙甘草 當歸身 人參已上各錢 水蛭五錢研 麝香少許研

連翹四錢 柴胡錢三 炙甘草 當歸身 人參已上各錢 水蛭五錢研 麝香少許研

連翹四錢 柴胡錢三 炙甘草 當歸身 人參已上各錢 水蛭五錢研 麝香少許研

蜜虫三箇去翅足炒另研

右除三味別研外生薑二片水二大盞煎至一盞去粗再下三味上火煎二沸

稍熱服食遠

羌活退賢湯 治太陽寒水醫膜遮睛不能視物

羌活一兩五錢

防風一兩

荊芥穗煎成藥加之

薄荷葉

藁本已上各七錢

酒知母五錢

黃蘗四錢

川芎

當歸身已上三錢

酒生地黃一錢

小椒五分

細辛少許

麻黃二錢用根

右咬咀每服三錢水二大盞煎至一盞半入荊芥穗再煎至一盞去粗相熱服食遠忌酒醋濕麵物

還睛紫金丹 治目眦歲久赤爛俗呼為赤瞎是也當以三稜針刺目眦外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛

兩目緊蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛之出醫膜亦退用手法攀出內臉向

外以針刺之出血

白沙蜜二十兩

甘草十兩燒七遍碎連水浸拌

黃丹六兩水飛

揀連三兩小便浸碎為末

南乳香

當歸已上

各上錢

烏魚骨二錢

硃砂小盞內放於瓶口上熏乾

麝香已上各一錢

白丁香直者五分

輕粉一兩

右

將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘草入下丹以柳枝攪次下餘藥以粘手為度作丸如雞頭大

每用一丸溫水化開洗

麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭

黃芪四錢

蒼朮

羌活

獨活

防風

升麻

葛根已上各三錢

炙甘草二錢

麻黃不去節冬月加

川椒

白芷已上各一錢

右咬咀每服五錢生薑三片棗二枚葱白三寸同煎至

一盞去粗溫服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐卧行立

溫肺湯 治鼻不聞香鼻眼多眵淚

丁香

分二

防風

炙甘草

葛根

羌活

已上各一錢

升麻

黃芪

已上各二錢

麻黃

不去節四錢

右為粗末水二盞葱白三根煎至一盞去粗食後服

御寒湯

治寒氣風邪傷於毛皮令鼻壅塞咳嗽上喘之證

黃連

黃藥

羌活

已上各二分

炙甘草

佛甘草

款冬花

白芷

防風

已上三分

升麻

人參

陳皮

已上各五分

蒼朮

黃芪

一錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞

去粗食後熱服

東垣老人 李杲 撰

明 新安 吳勉學 校

頭痛門

頭痛論

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角頭痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癰疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半邊痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高顙之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脉沉緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行

而足寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃附子細辛為主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其効如神白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時兩頰青黃暈眩目不欲開懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之更火使谿穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂上工矣

清空膏 治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱氣上壅損目及腦痛不止

川芎 伍錢 柴胡 赤錢 黃連 炒 防風 去芦 羌活 已上各壹兩 炙甘草 壹兩 細挺子黃芩 參兩去皮

製到一半酒製一半炒 右為細末每服二錢七於盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨卧

如苦頭痛每服加細辛 貳分 如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛羌活防風川芎甘草加半夏 壹兩

如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡 壹倍 如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白

虎湯加好吳白芷

徹清膏

蔓荊子 細辛 已上各壹分 薄荷葉 川芎 已上各叁分 生甘草 熟甘草 已上伍分 藁本 壹錢 右為細

末每服二錢食後茶清調下

川芎散 治頭目不清利

川芎

參分

柴胡

參分

羌活

防風

藁本

生甘草

升麻

已上各壹錢

熟甘草

酒生地黄

酒黃連

炒

酒黃芩

已上各肆錢伍分

右為細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌酒濕麵

白芷散

一名鬱金散

治頭痛

鬱金

壹錢

香白芷

石膏

已上各貳錢

薄荷葉

芒硝

已上各壹錢

右為極細末口含 waters 鼻內噏之

碧雲散

治頭痛

細辛

鬱金

芒硝

已上各壹錢

蔓荊子

川芎

已上各壹錢貳分

石膏

壹錢

青黛

壹錢

薄荷葉

貳錢

紅豆

壹箇

右為極細末口含 waters 鼻內噏之

羌活清空膏

蔓荊子

壹錢

黃連

壹錢

羌活

防風

甘草

已上各肆錢

黃芩

壹兩

右為細末每服一錢茶清

調下食後臨卧

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱常於氣海三裏灸之節次約五七十壯至年老添熱厥頭痛雖冬大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

荊芥穗

川芎

已上各貳分

蔓荊子

當歸身

蒼朮

已上各壹錢

酒黃連

生地黃

藁本

甘草

已上各壹錢

升麻

防風

已上各壹錢

酒黃蘗

炙甘草

黃芪

已上各壹錢

酒黃芩

酒知母

已上各壹錢

羌活

已上各壹錢

柴胡

伍錢

細辛

少許

紅花

少許

右劉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去

粗稍熱服食後

補氣湯 服前藥之後服此藥

柴胡貳分 升麻叁分

黃芪捌分 當歸身貳錢

炙甘草肆錢

紅花少許

右咬咀作二服

水二盞煎至一盞去粗稍熱服食後

細辛散 治偏正頭痛

細辛 瓦粉已上各

生黃芩 芍藥已上各

酒黃連 川芎已上各

炒黃芩 酒黃芩已上各

炙甘草壹錢 柴胡貳錢

右為麤末每服三錢水一大盞半煎至一盞取清食後服之

羌活湯 治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草柒分 澤瀉大錢

酒洗瓜蔓根 白茯苓 酒黃蘗已上各

柴胡柒錢 防風 細黃

苓酒洗 酒黃連 羌活已上各

右為麤末每服五錢重水用二盞煎至一盞取清食後臨卧通

口熱服之

養神湯 治精神短不得睡頭助腫急難伸禁甘溫宜苦味

木香 橘皮 柴胡已上各 酒黃芩貳分

人參 黃蘗 白朮 川芎已上各 升麻肆分

蒼朮 麥蘖麴 當歸身 黃連已上各

甘草 半夏已上各 黃芪壹錢 右咬咀每服五錢

水二大盞煎至一盞去粗稍熱服不拘時候

安神湯 治頭痛頭旋眼黑

生甘草 炙甘草已上各 防風貳錢 柴胡 升麻 酒生地黃 酒知母已上各 酒黃蘗 羌

活已上各

黃芪貳兩

右為麤末母服五錢水二大盞半煎至一盞半加麥荊子五分川芎三分

再煎至一盞去粗臨臥熱服

半夏白朮天麻湯 范天驥之內有脾胃證時顯煩躁胸中不利大便不通而又為寒氣拂鬱悶亂大作

火不伸故也疑其有熱服疎風丸大便秘結其藥少再服七八九次大便復見兩行前證不

廖增以吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭眩惡心煩悶氣短促上喘無力自言心神顛倒目

不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥余料前證是胃氣已損復下兩次則

重虛其胃而痰厥頭痛作矣與此藥而治之

黃蘗貳分酒洗

乾薑貳分

澤瀉

白茯苓 天麻

黃芪

人參

蒼朮已上各

炒神麴

白

朮已上各

麥蘗麵

半夏湯洗

橘皮已上各壹錢伍分

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗

熱服食前一服而愈此頭痛甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭眩風虛肉作非天

麻不能除黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘溫除濕補

中益氣澤瀉茯苓利小便通濕橘皮苦溫益氣調中升陽神麴消食蕩胃中滯氣大麥麴寬中助胃

氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗大苦寒瀉洗以療冬天少火在泉發躁也

口齒咽喉門

口齒論

論曰夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其牙齒是手足陽明之所過上齟齬於坤土乃足

陽明胃之脉所貫絡也止而不動下齧嚼物動而不休手陽明大腸之脉所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢為病不同熱甚則齒動齧齦袒脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作痛者有惡寒而作痛者有惡寒惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒齧腫起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙上多為虫所蝕其齒缺少而色變為虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉

羌活散 治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖內齧袒脫疼痛

藁本 香白芷 桂枝已上各參分 蒼朮 升麻已上各伍分 當歸身陸分 草豆蔻仁壹錢 羌活錢

分伍 羊脰骨反錢 麻黃去根 防風已上各參錢 柴胡伍錢 細辛少許 右為細末先用溫水嗽

口淨擦之其痛立止也

草豆蔻散 治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉 防風已上各貳分 羊脰骨反 熟地黄已上各伍分 當歸陸分 草豆蔻仁 黃連已上各壹錢參分

升麻貳錢 右為細末同前牙痛處擦之

麻黃散 治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼痛

防風 藁本已上各參分 羊脰骨反 當歸身 熟地黄已上各陸分 草豆蔻仁 升麻 黃連已上各壹錢

羌活壹錢 麻黃不去 草龍膽酒洗 生地黄已上錢 細辛少許 右為細末依前藥法擦之

熱牙散 一名麝香散

治大熱牙齒瘡露根肉齟脫血出齒動欲落疼痛妨食物銷反忤熱多

熟地黄 二分

益智仁 二分

當歸身 生地黄

麻黃根

酒漢防己

人參 已上各參分

升麻 錢一

草豆蔻

黃連 已上各一錢五分

羊脛骨灰 二錢

麝香 少許

右為細末如前藥擦之

治蟲散 一名白芷散

治大寒犯腦牙齒痠痛及蟲痛胃經濕熱腫痛

桂枝 一分

熟地黄 二分

藁本 白芷 已上各三分

當歸身

益智仁

黃連 已上各四分

羌活 伍分

吳茱萸 八分

草豆蔻

黃芪 升麻 已上各一錢

羊脛骨灰 錢一

麻黃 錢五分

右為細末同前擦

之

益智木律散 治寒熱牙痛

木律 二分

當歸 黃連 已上各四分

羊脛骨灰

益智皮

熟地黄 已上五分

草豆蔻皮 錢二

升麻 錢一

壹錢 伍分

右為細末用度如前擦之

如寒牙痛不用木律

蠟稍散

治大寒風犯腦牙痛

白芷 當歸身 柴胡 已上各貳分

桂枝 升麻

防風

藁本 黃芪 已上各參分

羌活 伍分

草豆

蔻皮 錢一

麻黃 去節壹錢 伍分

羊脛骨灰 貳錢 伍分

蠟稍 少許

右為細末如前法用之

白牙散

白芷 柒分

升麻 壹錢

石膏 壹錢 伍分

羊脛骨灰 貳錢

麝香 少許

右為細末先用溫水嗽口擦

之妙

刷牙藥

麝香壹分

生地黃

酒防己

熟地黃

已上各貳分

當歸身

人參

已上各叁分

草豆蔻皮

伍分

升麻壹錢

羊脰骨灰

黃連已上各貳錢

白豆蔻

草豆蔻

已上叁錢

沒石子

叁箇

五倍子

壹箇

右為極細末

如前法擦之妙

獨聖散 治一切牙痛風疳

北地蕤黎不以多少陰乾

右為細末每用刷牙以熱漿水漱牙外麤末熬漿水刷牙大有神効不可具述

可具述

當歸龍膽散

治寒熱停牙痛

香白芷

當歸梢

羊脰骨灰

生地黃

已上各伍分

麻黃

草豆蔻皮

草龍膽

升麻

黃連

已上各壹錢

錢

右為細末如前法擦之神効

牢牙地黃散

治腦寒痛及牙痛

藁本貳分

生地黃

熟地黃

羌活

防己

人參

已上各叁分

當歸身

益智仁

已上各肆分

香白芷

黃芪

已上各伍分

羊脰骨灰

吳茱萸

黃連

麻黃

已上各壹錢

草豆蔻皮

壹錢

升麻

壹錢

右為

細末如前法擦之

細辛散

治寒邪風邪犯腦牙齒痛

柴胡

防風

升麻

白芷

已上各貳分

桂枝

貳分

麻黃

去節

藁本

蒼朮

已上各叁分

當歸身

肆分

草豆蔻 伍分

羊脰骨灰

羌活 已上各錢伍分

細辛 少許

右為細末先漱後擦之佳

立効散

治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微惡寒飲大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰盛是五臟內

盛六腑陽道脉微小小便滑數

細辛 貳分

炙甘草 叁分

升麻 柒分

防風 壹錢

草龍膽 肆錢酒洗

右咬咀都作一服水一盞煎

至七分去粗以匙抄在口中燂痛處待少時則止

如多惡熱飲更加草龍膽壹錢此法不定隨寒

熱多少臨時加減若更惡風作痛加草豆蔻黃連 已上各伍分 勿加草龍膽

牢牙散

治牙齒肉綻有根牙疳腫痛牙動搖欲落牙齒不長牙黃口臭

羌活 壹兩

草龍膽 酒洗壹兩伍錢

羊脰骨灰 貳兩

升麻 肆兩

右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末

和勻臥時貼在牙齦上

清胃散

治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜

寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱

當歸身

擇細黃連 如連不好更加貳分夏月倍之

生地黃 酒製已上叁分

牡丹皮 伍分

升麻 壹錢

右為細末都作

一服水一盞半煎至一盞去粗帶冷服之

神功丸

治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕肉將脫牙齒落血不止

蘭香葉 如無薑香代之

當歸身

藿香 用葉

木香 已上各壹錢

升麻 貳錢

生地黃 酒洗

生甘草 已上各叁錢

黃連 去脂淨

酒洗

縮砂仁 已上各五錢

右同為細末湯浸飯餅為丸如菴豆大每服一百丸或加至二百

九止白湯下食遠服兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澼下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行女聞妄見者

桔梗湯 治咽腫微覺痛聲破

當歸身 馬勃已上各壹分

白殭蠶 黃芩已上各叁分

麻黃伍分不

桔梗 甘草已上各壹錢

桂枝少許

又方 治口瘡久不愈者 右為麤末作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱服之食後

黃蘗不計多少真者蜜塗其上又黃色

右為細末乾糝蒼上臨卧忌醋醬鹽

神驗法 治口瘡無問久新

夜間將二丸以勒緊左右交手揉三五十次但遇睡覺行之如此三五度因濕而生者一夜愈久病諸般口瘡三二夜愈如鼻流清涕者勒緊一丸揉之數夜可愈

內經云膀胱移熱於小腸隔腸不便上口為瘰易老五苓散與導赤散合而飲之

嘔吐門

丁香茱萸湯 治嘔吐噦胃虛寒所致

黃蘗叁分

炙甘草

丁香 柴胡

橘皮已上各伍分

升麻叁分

吳茱萸 蒼朮

人參已上各壹錢

當歸身壹錢伍分

草豆蔻仁 黃芪已上各貳錢

右為麤末每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服

食前

白朮湯一名茯苓湯

治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

炒神麴貳錢

陳皮天麻已上各

白朮白茯苓

麥蘖麴炒黃

半夏已上各

右呖咀每

服五錢水二盞入生薑五片同煎至一盞去粗稍熱服之

補肝湯一名柴胡湯

治素有風證不敢見風眼澀頭痛眼黑胸中有痰惡心兀兀欲吐遇風但覺皮肉墜

手足難舉重物如居暖室少出微汗其證乃減再或遇風病即復

柴胡

升麻藁本已上各

白茯苓桑分

炒神麴蒼朮已上各

半夏貳錢

生薑拾片

右為麤末都作一服水一大盞煎至一大盞去粗稍熱服

吳茱萸丸一名木香利膈丸

治寒在膈上噎塞咽膈不通

木香

青皮已上各

白殭蠶姜黃

澤瀉柴胡已上各

當歸身

炙甘草已上各

益智仁

人參

橘皮升麻

黃芪已上各

半夏壹錢

草豆蔻仁

吳茱萸已上各

麥蘖麴壹錢

右為細末湯浸餅為丸如菉豆大每服三十九丸溫水送下勿多飲湯恐速下細嚼亦得

衄血吐血門

麥門冬飲子

治吐血久不愈以三稜鍼於氣街出血立愈

黃芪壹錢

麥門冬

當歸身

生地黃人參已上各

五味子拾箇

右為麤末都作一服水

二盞煎至一盞去粗熱服不拘時

人參飲子

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

麥門冬貳分 人參去芦 當歸身已上各 黃芪 白芍藥 甘草已上各 五味子伍箇 右

為麤末都作一服用水二盞煎至一盞去粗稍熱服

一貧者有前證以前藥投之愈繼而至冬天居曠室臥大熱炕而吐血數次再來求治料此病久虛弱附臍有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉其裏之虛熱是其法也冬天居曠室衣蓋單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口憶仲景傷寒論中一證太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同予遂用之

三黃補血湯 治六脉俱大按之空虛心面赤善驚上熱乃手少陰心脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮

墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以甘辛微苦峻補其血

牡丹皮 黃芪 升麻已上各 當歸 柴胡已上各 熟地黄 川芎已上各 生地黃去錢

白芍藥伍錢 右以咀如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一大盞去粗稍熱服食前

如兩寸脉花血在上焦或衄血或嘔血與犀角地黃湯則愈

救肺湯一名人參 治吐血

甘草 蘇木 陳皮已上各 升麻 柴胡 蒼朮已上各 當歸稍 熟地黄 白芍藥 黃芪

人參已上各 右為麤末都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍溫食前服

麻黃桂枝湯

人參益上焦元氣不足而實其表也 麥門冬保肺氣已上各 桂枝以補表虛 當歸身和血養血各伍分 麻黃去根 甘草補其脾胃之虛

黃芪實表

白芍藥已上各壹錢

五味子伍箇安其肝氣

右以水三盞

先煮麻黃一味令沸去沫至二盞入

餘藥同煎至一盞去粗熱服臨卧只一服而愈更不再作

黃芪芍藥湯 治鼻衄血多面黃眼澀多眵手麻木

葛根

羌活已上各壹錢

升麻已上各壹兩

炙甘草貳兩

白芍藥

黃芪叁兩

右咬咀每服伍錢水

二盞煎至一盞食後

六脉弦細而濇按之空虛其色必白而天不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱溫澀

之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

止衄血法 治鼻血久不止素有熱而暴作者諸藥無驗補法以大紙一張作八摺或十摺於水內浸置

頂中以熱熨斗熨至一重或二重紙乾立止

腰痛門

川芎肉桂湯

丁未冬曹通甫自河南來有役人小翟露宿寒濕之地腰痛不能轉側兩脇痛急作痛已經月餘不愈

矣腰痛論中說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有二證屬少陽膽經外絡脉病皆去血

絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得用鍼只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血以此藥主之

酒漢防己

防風已上各壹錢

炒神麴

獨活已上各壹分

川芎

柴胡

肉桂

當歸稍

炙甘草

蒼朮已上各壹錢

羌活已上各壹錢

桃仁伍箇去皮尖研如泥

右咬咀都作一服好酒三大盞煎至一大盞去粗

沫

熱食遠服

獨活湯 治因勞後腰痛如折沉重如山

炙甘草 貳錢

羌活 防風

獨活

大黃 煨

澤瀉

肉桂 已上各參錢

當歸 稍

連翹 已上各伍錢

酒漢防已

酒黃蘗 已上各壹兩

桃仁 參拾箇

右咬咀

每服五錢

酒半盞

水一大盞

半煎至一盞

去粗熱

服

破血散瘀湯

治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活

防風

中桂 已上各壹錢

蘇木 壹錢伍分

連翹

當歸 稍

柴胡 已上各貳錢

水蛭 錢炒去烟盡別所

麝香

香 少許研

右伴分作二服每服酒一大盞水一大盞除水蛭麝香另研如泥煎餘藥作一大盞去粗

上火令稍熱調二味空心服之兩服立愈

地龍散

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下惡血在太陽經中令人腰脊痛或脛脇臂股中痛不可忍鼻

塞不通

當歸 稍壹分

中桂

地龍 已上各肆分

麻黃 伍分

蘇木 陸分

獨活

黃蘗

甘草 已上各壹錢

羌

活 貳錢

桃仁 陸箇

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗溫服食遠

蒼木湯

治濕熱腰腿疼痛

防風

風能勝濕

黃蘗 已上各壹錢始得之時寒也久不愈寒化為熱除濕止痛

柴胡 貳錢行經

蒼木 參錢去濕止痛

右都作一服水二大盞

煎至一盞去粗空心服

麻黃復煎散 治陰室中汗出懶語四肢困倦無力走注疼痛乃下焦伏火而不得伸浮而躁熱汗出一身盡痛蓋風濕相搏也以升陽發汗漸漸發之火鬱及濕在經者亦宜發汗況正值季春之月脉緩而遲尤宜發汗令風濕去而陽升以此困倦乃退氣血俱得生旺也

白朮 人參 生地黃 柴胡 防風 已上各五分 羌活 黃蘗 已上各壹錢 麻黃 去節微搗不令作末水五大盞煎令沸去

沫煎至二盞入下項藥再煎 黃芪 已上各貳錢 甘草 叁錢 杏仁 三箇去皮 右㕮咀都作一服入麻黃湯煎至一盞臨

臥服之勿令食飽取漸次有汗則効

緩筋湯 一名羌活湯 治兩目如火腫痛兩足及伏兔筋骨痛膝少力身重腰痛夜惡寒痰嗽頸項皆急

痛目外眦目絲急食不下

熟地黃 壹分 生甘草 柴胡 紅花 炙甘草 蘇木 獨活 已上各貳分 藁本 升麻 黃芩

草豆蔻仁 酒黃蘗 生地黃 當歸身 麻黃 已上各叁分 羌活 叁錢 蒼朮 伍分 右為麤末都

作一服水二大盞煎至一盞去粗食遠服之

拈痛湯 治濕熱為病肩背沉重肢節痠痛胸膈不利

白朮 壹錢伍分 人參 去芦 苦參 酒炒 升麻 去芦 葛根 蒼朮 已上各貳錢 防風 去芦 知母 酒洗

澤瀉 黃芩 炒 猪苓 當歸身 已上各叁錢 炙甘草 黃芩 酒洗 茵陳 酒炒 羌活 已上各伍錢 右

㕮咀每服一兩水二大盞煎至一盞去粗食遠服

蒼朮復煎散 治寒濕相合腦右痛惡寒項筋脊骨強肩背脚眼痛膝膕痛無力行步沉重

紅花 二分

黃蘗 五分

柴胡 藁本

澤瀉

白朮

升麻 已上各五分

羌活

壹錢

蒼朮

肆兩水

二蓋去粗入藥

右咬咀先煎蒼朮湯

二大蓋復煎前項藥至一大蓋稍熟空心服取微汗為効忌酒濕麵

羌活蒼朮湯 治脚膝無力沉重

炙甘草 黃蘗 草豆蔻

生甘草

葛根

已上各伍分

橘皮

陸分

柴胡

半

升麻

獨活 縮

砂仁

蒼朮

已上各壹錢

防風

伍分

黃芪

貳錢

知母

貳錢伍分

羌活

叁錢

右咬咀分作二服水二大

蓋煎至一蓋去粗空心服

婦人門

經閉不行有三論

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為血實實死不治婦人脾胃久虛或形羸氣血俱衰而致經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生天經者血脉津液所化津液既絕為熱所燥肌肉消瘦時見渴燥血海枯竭病名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此證或經適行而有子子不安為胎病者有矣或心包脉洪數躁作時見大便秘澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血海乾枯宜調血脉除包絡中火邪而經自行矣內經所謂小腸移熱於大腸為微瘕為沈脉澀不利則月事沉澀而不利故云為微瘕為沈也或因勞心心火上行月事不來安心和血瀉火經自行矣故內經云月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中令氣上迫肺心氣不得下故月事不來也經漏不止有三論

陰陽別論云陰虛陽搏謂之崩婦人脾胃虛損致命門脉沉細而數疾或沉弦而洪大有力寸關脉亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之其中有白帶者脉必弦細寒作於中中有赤帶者其脉洪數疾熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼脾胃證出見或四肢困熱心煩不得眠臥心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脉之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病者不行於診故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令拒死而心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕也陽氣內動發則心下崩數澁血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳為脉痿此之謂也

升陽除濕湯

一名調經升麻除濕湯

治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或

勞傷形體

或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜卧四肢不收困倦乏力無氣

以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脉二者受邪病皆在脉脉者血之府也脉者人之神也心不主令包絡代之故曰心之脉主屬心系心系者包絡命門之脉也主月事因脾胃虛而心包乘之故漏下月事不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸酒洗

獨活已上各

蔓荊子各

防風

炙甘草

升麻

藁本

已上各

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪

已上各壹錢伍分

右剉如麻豆大勿令作末都作一服以潔淨新汲水三大盞煎至一大盞

去粗空心熱服待少時以早飯壓之可一服而已如多足太陰脾經中血海穴二七壯亦已

此藥乃從權之法用風勝濕為胃下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也併血惡之物佳後必須黃芪人參炙甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加以和血藥便是也若經血惡物下之不絕尤宜究其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

涼血地黃湯

治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也

黃芩

荊芥穗

蔓荊子

已上各壹分

黃蘗

知母

已上各壹分

細辛

川芎

已上各貳分

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風

已上各叁分

生地黃

當歸

已上各伍分

甘草

壹錢

紅花

少許

右咬咀都作一

服水三大盞煎至一大盞去粗稍熱空心服之

足太陰脾之經中血海二穴在膝膕上內腓白肉際二寸中治女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脉

緩者是也灸三壯

足少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌

縱涎下煩逆溺難少腹急引陰痛股內腓痛婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黃如蠱女子如妊身

可灸三壯

酒煮當歸丸

治癰疽白帶下疰脚氣腰已下如在水雪中以火焙炕重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不住

寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀割削瘦峻之速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青藍如紫色目眈眈無所見身重如山行步欹側不能安地腿膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下痞煩心懊懷不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱虛欲竭噦嘔不止胃虛之極也脉沉欲緊而澀按之空虛若脉洪大而濇按之無力猶為中寒之證況按之空虛者乎按之不鼓是為陰寒乃氣血俱虛之極也

茴香

伍錢

黑附子

炮製去皮臍去

良姜

已上各

當歸

壹兩

右四味剉如麻豆大以上等好酒一升半

同煮交酒盡焙乾

炙甘草

苦練生用

丁香

已上各

木香

升麻

已上各

柴胡

貳錢

炒黃鹽

全椒

已上各

參錢

延胡索

肆錢

右與前四味藥同為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服五七十九丸空心淡醋湯

下忌油膩冷物酒濕麵

固真丸 治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目中溜火現物眈眈無所見齒白惡熱飲痛須得黃

連細末擦之乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上瀉是於標

故上壅而目中溜火腎侵肝而上溢致目眈眈而無所見齒惡熱飲者是陽明經中伏火也治法當大

瀉寒濕以丸約治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒製白石脂白龍骨以枯其濕炮乾姜大熟地

瀉寒水以黃蘗之大寒為因用又為鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後又為之伐其所主先其所因

之意而又瀉齒中惡熱飲也以柴胡為本經之使以芍藥五分導之蓋冰忍辛熱之藥太甚損其肝經是

故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脉此用藥之法備矣

黃藥酒洗

白芍藥已上各伍分

柴胡

白石脂

已上各壹錢火燒赤水飛細研日乾

白龍骨

酒炙日乾水飛為末

當歸

已上各貳錢乾薑炮

右件除龍骨白石脂水飛研外同為細末水煮麵糊為丸如雞頭仁大日乾

心多用白沸湯下無令胃中停滯待少時以早飯壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物酒濕麵

烏藥湯治婦人血海疼痛

當歸

甘草

木香已上各伍錢

烏藥壹兩

香附子貳兩炒

右以咀每服五錢水二大盞去粗溫服

食前

助陽湯一名升陽燥濕湯

治白帶下陰戶中痛控心而急痛身黃皮緩身重如山陰中如冰

生黃苓

橘皮已上各伍分

防風

高良薑

乾薑

郁李仁

甘草

已上各壹錢

柴胡

壹錢

白葵花

桑葉

右剉如麻豆大分作二服每服水二大盞煎至一盞去粗食前稍熱服

水府丹

治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹中暴痛面有黑點黎黑羸瘠

硃砂

紙隔湯淋熱取紅豆已上各伍錢

桂心

另為末

木香

乾薑已上各壹兩

砂仁

貳兩

經煨花蕊石

研伍兩

錢

班貓壹兩

生地黄汁

童子小便

各一臘月

狗膽

桑枝

芫菁

叁百箇去頭足糯米一斗炒米黃去米不用

右九味為細末同三斗熬為膏和如雞頭大硃砂為衣每服一丸溫酒細嚼食前服米飲亦可孕

婦不可服

丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脉二尺俱弦緊其按之無

力具證自覺臍下如水求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物多聞有如屋漏水下時有鮮血右尺脈時微洪也

熟地黃 白芍藥 已上各參分 川芎 丁香 已上各四分 阿膠 陸分 生艾葉 壹錢 當歸 一錢二分 右川芎

為細末當歸酒洗剉熟地黃丁香為細末艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零二分去

粗入膠再上火煎至一大盞帶熱空心服之

黃氏當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾損身失血自後一次縮一十日而來今次不止其人
心窄性急多驚以予料之必因心氣不足飲食不節得之大方曰無到彼診得掌中寒脈沉細而緩
而沉數九數微有不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足脾胃虛弱之證胃脘
心而痛左脇下縮急有積當臍有動氣腹中鳴下氣大便難虛證極多不能盡錄擬先治其本餘證可
以皆去安心定志鎮降其驚調和脾胃大益元氣補其血脈令養其神以大熱之劑去其寒凝在皮
膚肉少加生地黃去命門相火不令四肢痿弱

黃連 壹分 生地黃 參分 炒神麴 橘皮 桂枝 已上各伍分 草豆蔻仁 陸分 黃芪 人參 麻

黃 不去節已上各壹錢 當歸身 壹錢伍分 杏仁 五箇另研如泥 右以咀作二服水二大盞半煎麻黃令沸去沫煎至

二盞入諸藥同煎至一大盞於巳午之間食消盡服之一服立止其胃脘痛乃胃上有客寒與大熱

藥草豆蔻丸一十五丸白湯送下其痛立止再與肝之積藥除其積之根源而愈

當歸芍藥湯 治婦人經脉漏下不止其色鮮紅時值七月處暑之間先因勞後脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食非惟不入亦不思食沉懶困倦四肢無力大便時泄後再因心氣不足經脉再下不止惟覺氣下脫其元氣逆上全無惟覺心腹中氣下行氣短少不能言是無力以言非懶語也此藥主之

柴胡

貳分

炙甘草

生地黃

橘皮

熟地黃

黃芪

蒼朮

當歸

身 白芍藥

白木

右十味

咀咀如麻豆大分作二服水二盞半煎至一盞去粗稍熬空

心服之

柴胡調經湯

治經水不止鮮紅項筋急臍痛脊骨強痛

炙甘草

當歸身

葛根

獨活

藁本

升麻

柴胡

羌活

蒼朮

當歸

錢 紅花

右剉如麻豆大都作一服水四大盞煎至一盞去粗空心稍熱服取微汗立止

一婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘕水泄不止穀有時不化後血塊暴下并水俱作是前後二陰有形之血脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三兩行食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無勝無虛遺人天殃無致邪無失正絕

人長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之即愈下之即死大抵聖人立法且如升

陽或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣此病是也當用此法治之升

降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不畏

降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不畏

降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天則昌逆天則亡可不畏

哉夫人之身亦有四時天地之氣不可止認在外人亦體同天地也今經漏不止是前陰之氣血已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷以脫矣後陰者主有形之物也前陰者精氣之戶下竭是病人周身之血氣常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也陽生陰長春夏是也在此人之身令氣升浮者穀氣上行是也既病人周身血氣皆不生長穀氣又不勝其肌肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元二陰俱脫血氣將竭假令當是熱證今下焦久脫化為寒矣此病久沉久降寒濕大勝當急救之瀉寒以熱除濕以燥大升大舉以助生長補養氣血不致偏竭聖人立治之法既濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝濕是以所勝平之也當先調和胃氣次用白朮之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此便是大舉大升以助春夏二濕之久陷下之至治也

益胃升陽湯 血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉

世皆以為補殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之身內胃氣為寶

柴胡 升麻 已上各伍分 炙甘草 當歸身 酒洗 陳皮 已上各壹錢 人參 去土有 炒神麴 已上各伍分

黃芪 貳錢 白朮 叁錢 生黃芩 少許 右咬咀每服二錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服

如腹中痛每服加白芍藥 叁分 中桂 少許 如渴或口乾加葛根 貳分 不拘時候

升陽舉經湯 治經水不止如右尺脉按之空虛是氣血俱脫大寒之證輕乎其脉數疾舉指弦緊或澀

皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之此

法當大升浮血氣切補命門之下脫也

肉桂去皮盛夏勿用秋冬用 白芍藥 紅花已上各伍分 細辛陸分 人參去芦 熟地黄 川芎已上各壹錢 獨活

根 黑附子炮製去皮臍 炙甘草已上各錢伍分 羌活 藁本去土 防風已上各貳錢 白朮 當歸 黃芪已上各壹錢

各參 柴胡已上各錢 桃仁拾箇湯浸去皮尖細研 右咬咀每服三錢若病勢順當漸加至五錢每服水三

盞煎至一盞空心熱服

半產誤用寒涼之約論

婦人分免及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴去不能鎮撫也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽便二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內裡有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈是建用寒涼藥也分免半產本氣不病是暴去其血亡血補血又何疑焉補其血則神豈常時血下降亡今當補而升舉之心得血而養神不昏矣血若暴下是秋冬之令大旺今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足也

全生活血湯

紅花叁分 蔓荊子 細辛已上各伍分 生地黄夏月多加之 熟地黄已上各壹錢 藁本 川芎已上各壹錢 防

風治陽既竭何以和羌活獨活炙甘草柴胡去苗當歸身酒洗葛根已上各白芍藥

升麻已上各右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服

當歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下

當歸貳分炒鹽叁分蠟相升麻已上各甘草陸分柴胡柒分黃蘗少許為附子壹錢

乾薑良薑各一右為麤末每服五錢水五盞煎至一盞去粗稍熱服或為細末清麪糊為丸亦可

調經補真湯冬後一月微有地泥永洋其白帶再米陰戶中寒一服立止

獨活乾薑地薑本防風蒼朮已上各麻黃蘇去炙甘草人參去當歸身白

朮生黃芩升麻已上各黃芪柒分良薑澤瀉羌活已上各柴胡肆錢杏仁貳箇

桂枝少許白葵花法藥去萸右吹咀除黃芩麻黃各另都作一服先以水三大盞半煎麻黃一味

令沸掠去沫入餘藥同煎至一盞去滓分再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

坐藥龍鹽膏

茴香叁分枯礬伍分良薑當歸梢酒防已木通已上各丁香木香川烏炮已上

分龍骨炒鹽紅豆肉桂已上各厚朴叁錢延胡索伍錢全蠍伍箇右為細末煉

蜜為凡如彈子大綿裹留系在外內丸藥陰戶內日易之

勝陰丹為水藥力小再取三錢內加行性熱藥項下

柴胡羌活枯白朮甘松升麻已上各川烏頭大椒三奈子已上各蒜柒分破故

紙制分與蒜同
煑焙乾拌

全蠍冬箇

麝香少許

右為細末依前法用

迴陽丹

羌活

全蠍

升麻根

甘松已上各

草烏頭

水蛭炒已上

大椒

三奈子

華撥

枯礬

已上各

柴胡

川烏已上各

炒黃鹽為必用之藥

去之則不効

破故紙

蒜已上各

五蛇三箇去

翅足炒

右

為極細末依前製用臍下覺暖為効

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲臨經先腰臍痛甚則腹中亦痛經縮三兩日

生地黃

貳分

丁香肆分

當歸身

防風

羌活已上各

柴胡壹錢

全蠍

壹箇

右件都作

一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服

延胡苦煉湯

治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃蘗

壹分為

延胡索

苦練子已上各

附子貳分

肉桂已上各

炙甘草

伍分

熟地黃

壹錢

右都作一服水二大盞煎至一盞食前服

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒

黃蘗

貳分

知母已上各

肉桂壹錢

附子壹錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗食

遠熱服

如少食常飽有時似腹脹分悶加白芍藥伍分

如不思飲食加五味子貳拾箇

如煩

惱面上如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪壹錢

五分

人參柒分

炙甘草

已上各

升麻

已上各

人參補氣湯 治四肢懶倦自汗無力

丁香末 貳分 生甘草稍 炙甘草已上各 貳分 生地黃 白芍藥已上各 伍分 熟地黃陸分 人參

防風 羌活 黃蘗 知母 當歸身 升麻已上各 貳分 柴胡壹錢 黃芪壹錢 伍分 全蠍壹箇 五

味子貳拾 右判如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗空心稍熱服

黃芪白朮湯 治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸而還惡風頭痛躁熱

細辛貳分 吳茱萸 川芎已上各 伍分 柴胡 升麻已上各 壹錢 當歸身壹錢 伍分 黃蘗酒洗 炙甘草

羌活貳錢 五味子壹錢 白朮 人參已上各 伍錢 黃芪壹兩 右咬咀每服五錢水二大盞生

薑五片煎至一盞去粗食前熱服 如腹中痛不快加炙甘草壹錢 汗出不止加黃蘗壹錢

白朮茯苓湯 治胃氣弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白朮 白茯苓 半夏已上各 壹兩 炒麴貳錢 麥蘗貳錢 炒 伍分 右咬咀每服五錢水二大盞生薑

五片煎至一盞去粗不拘時服

增味四物湯 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 京三稜 乾漆炒燥烟 盡 肉桂去皮 廣茂已上各 等分 右為纒末

每服五錢水二大盞煎至一盞去粗食前稍熱服

補經固真湯

白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不効診得寸口尺脉微其白帶下流不止叔和云崩中日久為白帶

漏下時多骨木枯崩者始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津

液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經藥為引用為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋血津液以大辛熱之氣味藥補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥為佐而益元氣

白蔘花去毒研甘草炙

郁李仁去皮火研泥

柴胡已上各壹錢

乾薑細末

人參已上各貳錢

生黃芩研

錢陳皮五分

右件除黃芩外以水三盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至一盞去粗空心熱服

少時以早飯壓之

溫衛補血湯 治耳鳴鼻不聞香臭口不知穀味氣不快四肢困倦行步欹側髮脫落食不下膝冷陰汗

帶下喉中呿呿不得臥口舌益乾太息頭不可以回顧項筋緊脊強痛頭眩眼黑頭痛不嚏

生地黃

白朮霍香黃蘗已上各壹分

牡丹皮蒼朮

王瓜根

橘皮

吳茱萸已上各貳分

當歸

歸身半

柴胡人參熟甘草

地骨皮已上各叁分

升麻肆分

生甘草伍分

黃芪壹錢貳分

丁香壹箇

桃仁叁箇

葵花柒朵

右咬咀作一服用水二大盞煎至一盞去粗食煎熱服

立効散 治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花已上各壹兩

右剉如豆大白紙裹定泥固炭火燒灰存性為

細末

如乾血氣研血竭為引好溫酒調服如輕粉壹錢

如血崩不止如瘧疾引好溫酒調服

四聖散 治婦人赤白帶下

溫經除濕湯

川烏 炮製

生白礬

已上各壹錢

紅娘子

冬筍

斑猫

指箇

煉蜜為丸如兒子大綿裹坐之

十月霜冷後四肢無力乃痿厥濕熱在下焦也醋心者是濁氣不下降欲為滿也合眼麻木作者陽道不行也惡風寒者上焦之分皮膚中氣不行也開目不寐者目開助陽道故陰寒之氣少退也頭眩眩運者風氣下陷於血分不得伸越而作也近火則有之

黃連

壹分

柴胡

草豆蔻

神麴

炒

木香

已上各貳分

麻黃

節 不去

獨活

當歸身

黃蘗

已上各壹分

分

升麻

伍分

羌活

柒分

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉

已上各壹錢

黃芪

橘皮

蒼朮

已上各貳錢

白芍藥

叁錢

右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞食遠服治支節沉重疼

痛無力之勝藥也

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病診得六脉俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而閉目則麻木漸退久則絕止常閉其目此證不作懼其麻木不敢合眼致不得眠身體皆重時有痰嗽覺胸中常似有痰而不利時煩躁氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼為最苦觀其色脉形病相應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脉皆屬於目靈樞經云閉目則陽道行陽氣遍布週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以為然細按之則有區別且久坐而起

亦有廢木為如繩縛之久釋之覺麻作而不敢動良久則自己以此驗之非有風邪乃氣不行主治之
當補其肺中之氣則麻木自去矣如經脈中陰火乘其陽分火動於中為麻木也當兼去其陰火則愈
矣時疾嗽者秋涼在外在上而作也當以溫劑實其皮毛身重脉緩者濕氣伏匿而作也時見躁作當
升陽助氣益血微瀉陰火與濕通行經脉調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有邪也此藥主之

生甘草

去腎熱酒黃蘗

瀉火白茯苓

除濕澤瀉

除濕升麻

行陽柴胡

已上各壹錢蒼朮

草豆蔻仁

益陽退外寒已上各壹錢伍分橘皮

當歸身

白朮

已上各貳錢白芍藥

人參

已上各壹錢佛耳草

甘草

已上各壹錢伍分黃芪

右咬咀每服五錢水

二盞煎至一盞去粗食遠服之

麻黃桂枝升麻湯

治婦人先患渾身麻木睡覺則少減開目則已而全愈又證已痊又因心中煩惱

遍身骨節痠身體沉重飲食減少腹中氣不運轉

木香

生薑

桂枝

半夏

陳皮

草豆蔻仁

厚朴

草

升麻

白朮

茯苓

澤瀉

已上各叁分黃芪

麻黃

節人參

已上各伍分右都作一服水二

盞煎至一盞去粗食遠服之

東垣老人 李杲 撰

明 新安 吳勉學 校

大便結燥門

大便結燥論

金匱真言論云北方黑色入通腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難者取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若饑飽失節勞役過度損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥然結燥之病不一有熱燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結燥者治法云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結者溫之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響然不能大便者以苦藥泄之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黃通之風結燥而大便不行者以麻子仁加大黃利之如氣澀而大便不通者以郁李仁枳實皂角仁潤之大抵治病必究其源不可一槩用巴豆牽牛之類下之損其津液燥結愈甚復下復結梗則以至導引於下而不通遂成不救噫可不慎哉

通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸閉不開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草

紅花已上各壹分

生地黃

熟地黃配各壹分

升麻

桃仁泥

當歸身已上各壹錢

右都作一

服水二大盞煎至一盞去粗調檳榔細末五分稍熱食前服之

潤燥湯

升麻

生地黄

已上各貳錢

熟地黄

當歸稍

生甘草

大黃煨

桃仁泥

麻仁已上各壹錢

紅花伍分

右除桃仁麻仁另研如泥外剉如麻豆大都作一服水二盞入桃仁麻仁泥煎至一盞去粗空心稍熱服

潤腸丸

治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥閉塞不通全不思食及風結血秘皆令閉塞也以潤燥和血

疎風自然通利矣

桃仁

湯浸去皮尖

麻仁

已上各壹兩

當歸稍

大黃煨

羌活已上各壹錢

右除桃仁麻仁另研如泥外搗

為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心白湯下

如病人不大便為大便不通而澀其邪盛者急加酒洗大黃以利之如血燥而大便燥乾者加桃仁酒

洗大黃

如風結燥大便不行者加麻仁大黃如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之

如脉澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥如寒陰之病為寒結閉而大便不通

者加郁李仁大黃以除氣燥如寒陰之病為寒結閉而大便不通者以局方中半硫丸或如煎附子

乾薑湯水冷與之其病雖陰寒之證當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與一服藥微通其大

便不令結閉乃治之大法若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜於陽藥中少加

苦寒之藥以去熱燥燥止勿加如陰燥欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細而遲此易為辯耳

知有客邪之病亦當從權如藥以去之

麻黃白朮湯 治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹尤其甚色黃麻木身重如山沉困無

力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時躁熱發欲去衣須臾熱過振寒項額有時

如水額寒尤甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛當臍中有動氣按之堅硬而痛

青皮

去腐

酒黃連

已上各壹分

酒黃蘗

橘紅

甘草

升麻

黃芪

人參

桂枝

白

朮厚朴

柴胡

蒼朮

猪苓

吳茱萸

白茯苓

澤瀉

白豆蔻

炒麴

已上各伍分

分伍

麻黃

不去節

杏仁

肆箇

右咬咀分作二服水二大盞

半先煎麻黃令沸去沫再入諸藥

同煎至一盞去粗稍熱食遠服

此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽道為上盛元氣短少上端為陰火傷其氣四肢痿

在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實其母肺金尅木凌火是大勝必有大復

其證善惡欠多噎鼻中如有物不聞香臭目視眈眈多悲健忘少腹急痛通身黃腹大脹面目腫尤

甚食不下痰唾涕有血目皆瘍大便不通並宜此藥治之

升陽湯 一名升陽瀉濕湯

治膈咽不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子

已上各貳分

生地黃

熟地黃

黃蘗

已上各叁分

當歸身

甘草梢

已上各肆分

蒼朮

伍分

升麻

柒分

黃芪

壹錢

桃仁

拾箇

右咬咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞煎至一盞

去粗稍熱食前服

活血潤燥丸 治大便秘血秘常燥結

當歸稍壹錢

防風叁錢

大黃濕紙

羌活已上各壹兩

皂角仁燒存性去皮壹兩伍錢其性得濕則滑濕滑則燥結自除

桃

仁貳兩研如泥

麻仁貳兩伍錢研如泥

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服

五十丸白湯下三兩服後須以蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也以磁器盛之紙封

無令見風

潤腸湯 治大腸結燥不通

生地黃 生甘草

已上各壹錢

大黃煨

熟地黃

當歸稍

升麻

桃仁

麻仁

已上各壹錢

紅花

叁分

右咬咀水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云病有閼有格閼則不得小便又云關無出之謂皆邪熱為病也分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之如渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故渴而小便不利也夫小便者是足太陽膀胱經所主也長生於中者西方金也肺合生水若肺中有熱不能生水是絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源也故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如露如霜皆從天而降下也乃陽中之陰明秋氣自天而降下也且藥有氣之薄者乃陽中之陰是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲世之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通瞿麥扁蓄之類以清肺之氣泄其火資水之上源

也如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而大燥小便不通也熱閉於下焦者腎也膀胱也乃陰中之陰陰受熱邪閉塞其流易上老云寒在胸中過絕不入熱在下焦填塞不便須用感北方寒水之化氣味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足也須用感地之水運而生大苦之味感天之寒藥而生大寒之氣此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣入票之生膀胱寒水之運入感之生腎此藥能補腎與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必伏其所主而先其所因其始則氣同其終則氣異也

通關丸 一名滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃蘗

去皮剉酒洗焙

知母

剉酒洗焙乾

肉桂

伍分

右為細末熟水為丸如梧桐子大每服一百丸空心

白湯

下頃兩足令藥易下行故也如小便利則陰中如刀刺痛當有惡物下為驗

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心

壹分

通草

貳分

澤瀉

瞿麥

琥珀

已上各伍分

扁蓄

木通

已上各柒分

車前子

炒壹錢

茯苓

苓

去皮貳錢

猪苓

去皮叁錢

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熱食遠服或局方八正散五

苓散亦宜服之

導氣除燥湯

治小便閉塞不通乃血滯至氣不通而致澀也

茯苓

去皮

滑石

炒黃之上各貳錢

知母

剉酒洗

澤瀉

已上各叁錢

黃蘗

去皮酒洗肆錢

右咬咀每服五錢水三盞

至一盞去粗稍熱空心服如急閉不拘時服

腎疸湯 治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澀

羌活 防風 藁本 獨活 柴胡 已上各伍分 升麻 伍錢 已上治腎疸目黃渾身黃 白茯苓 伍分

澤瀉 叁分 猪苓 肆分 白朮 伍分 蒼朮 壹錢 已上治小便赤澀 黃蘗 貳分 人參 叁分 葛

根 伍分 神麴 陸分 甘草 叁錢 右剉如大豆大分作二服水三盞煎至一盞去粗稍熱食前服

痔漏門

痔漏論

內經曰因而飽食筋脉橫解腸澀為痔夫大腸庚也主津本性燥清肅殺之氣本位壬收其所司行津以從足陽明旺則生化萬物者也又陽明為中州之土若陽衰亦須殺萬物故曰萬物生於土而歸於土者是也以手陽明大腸司其化焉既在西方本位為之害蜚司殺之府因飽食行房乃世前陰之氣歸於大腸木乘火勢而侮燥金故火就燥也大便秘閉其疾甚者當以苦寒瀉火以辛溫和血潤燥疎風止痛是其治也以秦艽當歸稍和血潤燥以桃仁潤血以皂角仁除風燥以地榆破血以枳實之苦寒補腎以下泄胃實以澤瀉之淡滲使氣歸於前陰以補清燥受胃之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣之不足其甘味以瀉火而益元氣也故曰甘寒泄火乃假枳實之寒也古人用藥為下焦如漬又曰在下者引而竭之多為大便秘澀以太黃推去之其津血益不足以當歸和血及油潤之劑大便自然轉利矣宜作劉湯以與之是下焦有熱以急治之之法也以地榆酸苦而壞血故宿食消盡生作丸服之

秦艽白朮丸 治痔瘡并痔漏有膿血大便燥硬而作疼痛不可忍

秦艽

去芦

桃仁

湯浸去皮尖

兒角仁

燒存性

當歸梢

酒浸

澤瀉

枳實

炒

白朮

已上各

地榆

參錢

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為丸如雞頭仁大令樂光滑焙乾每服五七

十丸白湯下空心服待少時以美饀壓之忌生冷硬物冷水生菜之類并濕麵酒及辣辛熱大料物之類犯之則藥無驗也

秦艽蒼朮湯 治痔瘡若破謂之痔漏大便秘澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受

病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣而合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也若大便秘結者主病兼受火邪熱結不通也去此四者具三方肺主諸氣其體收下亦助病為邪須當破氣藥兼之治法全矣以剉湯與之其効如神

秦艽

去苗

桃仁

湯浸去皮尖

兒角仁

燒存性

蒼朮

製

防風

已上各

黃蘗

去皮酒洗

當歸梢

澤瀉

已上各

梭身檳榔

各壹分

大黃

少許雖大便過澀亦不可多用

右除檳榔桃仁兒角仁三味外餘藥

咀

如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞二分去粗入檳榔等三味末再上火煎至一盞空心熱服待

少時以美饀壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒濕麵大料物乾薑之類犯之則其藥無効

如有白膿加白葵花頭五朵去心青皮半錢不去白入正藥中同煎木香三分為細末同檳榔等三

味依前煎服餌古人治此疾多以歲月除之此藥一服則愈

七聖丸 治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生於脾臧傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦火莫謾多方

立紀綱

羌活 宣兩

郁李仁

湯浸去皮另研，宣兩伍錢

大黃 捌錢

檳榔

桂 去皮

木香

川芎

已上各伍錢

右除郁李

仁另研入外共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十九白湯下食前取大便微利一服而愈切禁不得多利大便其痛滋甚

秦艽防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦艽

防風

當歸身

白朮

已上各壹錢伍分

炙甘草

澤瀉

已上各陸分

黃蘗

伍分

大黃

煨

橘皮

各叁分

柴胡

升麻

已上各貳分

桃仁

叁拾箇

紅花

少許

右劉如麻豆大都作一服水三盞煎至一

盞去粗稍熱空心服之避風寒忌房事酒濕麵大辛熱物

秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂不任其瘡

羌活

壹錢貳分

秦艽

黃芪

已上各壹錢

防風

叁分

升麻

炙甘草

麻黃

柴胡

已上各伍分

葶本

叁分

細辛

少許

紅花

少許

右劉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗

空心服之忌風寒麪大

小便

當歸郁李仁湯 治痔漏大便硬努出大腸頭下受苦痛不能忍

郁李仁

兒角仁

已上各壹錢

枳實

叁分

秦艽

麻仁

當歸梢

生地黃

蒼朮

已上各伍分

大黃

煨

澤瀉

已上各叁分

右劉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗入兒角仁末調空心食前

服之忌如前

紅花桃仁湯 治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸僻為痔治法當補北方瀉中央

黃蘗 壹錢 伍分

生地黃 壹錢

澤瀉 捌分

蒼朮 陸分

當歸梢

漢防己

防風梢

猪苓 已上各 伍分

麻黃 貳分

紅花 半分

桃仁 拾箇

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞去粗稍熱食則服之忌如

前

秦艽當歸湯 治痔漏大便結燥痠痛

大黃 煨肆錢

秦艽 枳實 已上各 壹錢

澤瀉

當歸梢

皂角仁

白朮 已上各 伍分

紅花 少許

桃

仁 貳拾 箇

右都作一服水三盞煎至一盞去粗食則熱服忌如前

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

一富者前陰臊臭又因連日飲酒腹中不和求先師治之曰夫前陰者是厥陰肝之脉絡循陰器出其挺末凡臭者心之所主散入五方為五臭入肝為臊此其一也當於肝經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少衝乃治其標如惡針當用藥除之酒者氣味俱陽能生裏之濕熱是風濕熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒是濕熱之水亦宜決前陰以去之

龍膽瀉肝湯 治陰部時復熱痒及臊臭

柴胡梢

澤瀉 已上各 壹錢

車前子

木通 已上各 伍分

生地黃

當歸梢

草龍膽 已上各 叁分

右剉如

麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗空心稍熱服便以美膳壓之此藥柴胡入肝為引用澤瀉

車前子木通淡滲之味利小便亦除臊氣是名在下者引而竭之生地黃草龍膽之苦寒溫酒濕熱更兼車前子之類以撤肝中邪氣肝主血用當歸以滋肝中血不足也

清震湯 治小便溺黃臊臭淋瀝兩丸如冰陰汗浸多

羌活 酒黃蘗已上各壹錢 升麻 柴胡 蒼朮 黃芩已上各伍分 澤瀉肆分 麻黃根 猪苓 防風

已上各叁分 炙甘草 當歸身 藁本已上各貳分 紅花壹分 右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至

一盞去粗臨臥服大忌酒濕麵

固真湯 一名正元湯 治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有餘滴尻臀并前陰冷惡寒而喜熱膝下

亦冷

升麻 羌活 柴胡已上各壹錢 炙甘草 草龍膽 澤瀉已上各壹錢伍分 黃蘗 知母已上各貳錢 右剉

如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞去粗空心稍熱服以早飯壓之

清龜湯 一名柴胡勝濕湯 治兩外腎冷兩髀陰汗前陰痿陰囊濕痒臊氣

柴胡 生甘草 酒黃蘗已上各貳錢 升麻 澤瀉錢伍分 當歸梢 羌活 麻黃根 漢防已

草龍膽 茯苓已上各壹錢 紅花 少許 五味子貳拾箇 右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞

去粗食前稍熱服忌酒濕麵房事

椒粉散 治前陰兩丸濕痒痛秋冬甚夏月減

肉桂貳分 小椒 當歸梢 猪苓已上各三分 蛇床子 黑狗脊已上各伍分 麻黃根 壹錢 輕粉少

紅花 少許

班貓 兩枚

右為末乾糝上避風寒冷濕處坐臥

補肝湯

治前陰冰冷并陰汗兩脚痿弱無力

黃芪 五分

炙甘草 五分

升麻

猪苓 已上各四分

白茯苓

葛根

人參 已上各三分

柴胡

羌活

陳皮

連翹

當歸身

黃蘗 炒

澤瀉

蒼朮

麴末

知母

防風 已上各五分

右劉如麻豆大

都作一服水一大盞煎至一盞去粗空心稍熱服忌酒濕麵

溫腎湯 治面色痿黃身黃脚痿弱無力陰汗

柴胡

麻黃根 已上各五分

白茯苓

白朮

酒黃蘗

猪苓

升麻 已上各一錢

蒼朮

防風 已上各五分

錢五分

澤瀉 二錢

右分作二服每服水一大盞煎至一盞去粗食前稍熱服一時辰許方食

延胡丁香丸

一名丁香氣丸

治臍下撮急痠痛并周身皆急痛小便頻數及五脉急獨腎脉按之不

急皆虛無力名曰腎疝

羌活 卷錢

當歸

茴香 已上各二錢

延胡索

麻黃根節

肉桂 已上各一錢

丁香

木香

甘草

川烏頭 已上各五分

防己 卷錢

蠍 拾叁箇

右為細末酒煮麴糊為丸如雞頭大每服五十九空心鹽白

湯服

瀉痢門

訶子皮散

癸卯冬白樞刺家一老僕面塵脫色神氣特弱病脫肛日久服藥未驗復下赤白膿痢作裏急後重白

多赤少不任其苦以求其治曰此非肉食膏粱必多蔬食或飲食不節天氣雖寒衣蓋猶薄不覺而脫頭脫下者寒也真氣不禁形質不收乃血滑脫也此乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當以澀去其脫而除其滑微酸之味固氣上收以大熱之劑而除寒補陽以補氣之藥升陽益氣

御米殼

去蒂炒

橘皮

已上各五分

乾薑

炮陸

訶子

煨去核

右為細末都作一服水二盞煎至一盞

和祖空心熱服

升麻補胃湯 治宿有陽明血證因五月間大熱喫杏腸癖下血啣遠散漫如篩腰沉沉然腹中不痛血色紫黑病名濕毒腸癖屬陽明少陽經血證也

白芍藥

壹錢伍分

升麻

羌活

黃芪

已上各壹錢

生地黃

熟地黃

獨活

牡丹皮

炙甘草

防風

已上各伍分

當歸身

葛根

已上各叁分

肉桂

少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞

一盞去粗食前稍熱服

升陽去熱和血湯 治腸癖下血另作一派其血啣出有力而遠射四散如篩腸中血下行腹中大作痛

乃陽明氣衝熱毒所作也當升陽去濕熱和血脈定其治也

橘皮

貳分

熟地黃

當歸身

蒼朮

秦朮

肉桂

已上各叁分

生地黃

牡丹皮

生甘草

升麻

七分

熟甘草

黃芪

已上各壹錢

白芍藥

伍分

右咬咀都作一服水四盞煎至一盞去

粗空心稍熱服立効

益智和中湯 治腸癖下血或血色紫黑腹中痛腹皮惡寒右手關脈往按之無力而喜熱物熨之內

寒明矣

肉桂 壹分

桂枝 肆分

牡丹皮

柴胡 葛根

益智仁 半夏 已上各伍分

當歸身

炙甘草

黃芪

升麻 已上各壹錢

白芍藥 壹錢伍分

乾薑 少許

右為麤末都作一服水三盞煎至一盞去粗食

後溫服

芍藥藥皮丸

治濕熱惡刺血刺頻併瘡痛無問膿血並皆治之

芍藥

黃藥 已上各壹兩

當歸

黃連 已上各伍錢

右為末飯為丸如雞頭大每服五七丸食前米飲

湯下忌油膩酒濕麵等物

和中益胃湯

治太陰陽明腹痛大便常泄若不泄即秘而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛

脇下急縮脉緩而洪弦中之下得之按之空虛

蘇木 壹分

蒙本

益智仁 已上各二分

熟地黃

炙甘草 已上各叁分

當歸身 四分

柴胡

升麻 已上伍分

分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服

槐花散

治腸癖下血濕毒下血

川芎 四分

槐花

青皮 荊芥穗

熟地黃

白朮 已上各陸分

當歸身

升麻 已上各壹錢

右為細

末每服三錢米飲湯調下食前忌酒濕麵生冷硬物

茯苓湯

治因傷冷飯水泄一夜走十行變作白痢次日其利赤白腹中疼痛減食數躁四肢沉困無力

生黃芩 三分

當歸身 肆分

肉桂

炙甘草 已上各伍分

猪苓

茯苓 已上各陸分

澤瀉 壹錢

芍藥 壹錢

分伍 蒼朮 生薑 升麻 柴胡已上各

右咬咀如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去

粗稍熱食前服之

黃芪補胃湯 治一日大便三四次澇而不多有時作泄腹中鳴小便黃

黃芪 柴胡 當歸身 益智已上各 橘皮已上各 升麻陸分 炙甘草貳錢 紅花少許

都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前服之

右咬咀

升陽除濕湯 自下而上者引而去之

蒼朮壹錢 柴胡 羌活 防風 升麻 神麴 澤瀉 猪苓已上各 炙甘草伍分 陳皮 桑葉

麵已上各 右都作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之 如胃寒腸鳴加益智仁半夏各伍分

生薑三片棗一枚同煎至非腸鳴不得用

人參益胃湯 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠墮躁熱短氣口不知味腹鳴大便微澇身體虛

費渴不喜冷物

黃芪 甘草 當歸稍 益智已上各 人參 黃苓 柴胡 半夏 白朮已上各 陳皮 升麻

已上各 蒼朮壹錢 紅花少許 右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前服之

升麻補胃湯 治因內傷服牽牛大黃食藥泄瀉過多腹中大痛

甘草柒分 升麻 柴胡 草豆蔻 黃芪已上各 半夏叁分 當歸身 乾薑已上各 紅花

少許 右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服之

瘡瘍門

散腫消堅湯 治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或有土或於脇下皆手足少陽經中及瘰癧漏於頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二證瘡已破流膿水並皆治之

黃芩

柳錢酒洗炒

草龍膽

酒洗各炒四遍

瓜蒌根

剉碎酒洗

黃蘗

酒製

酒知母

桔梗

昆布

已上各伍錢

肆錢

炙甘草

京三稜

酒洗

廣茂

酒洗炒

連翹

已上各叁錢

葛根

白芍藥

當歸梢

黃連

錢貳

升麻

陸分

右以咀每服六錢水二盞零八分先浸多半日煎至一盞去粗食後執服於非

處伸足在高處頭低垂每含一口作十次嚥服畢依常安臥取藥在膈上停一食也另攢半料作細末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸用此藥湯留一口送下或加海藻五錢炒亦妙

升陽調經湯 治瘰癧遠頸或至頰車此皆由足陽明胃經帶來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中

來乃戊脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻

柳錢

葛根

草龍膽

酒製

黃芩

酒製

廣茂

酒洗炒

京三稜

酒洗炒

炙甘草

連翹

桔梗

已上各伍錢

生黃芩

肆錢

當歸梢

芍藥

已上各叁錢

黃蘗

酒洗

知母

酒洗炒壹兩

右另秤一半作末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸一半作咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七

八錢水二盞先浸半日煎至一盞去粗臨臥熱服足高去枕仰臥噙一口作十次嚥之留一口在後

送下丸藥服畢其臥如常

連翹散堅湯 治耳下或至缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀從手足少陽經中來也或

生兩脇或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡壹兩

草龍膽酒洗

土瓜根酒製已

黃芩酒炒

當歸酒洗

生黃芩

廣茂

京三稜

同廣茂

連翹

芍藥已上各

炙甘草各錢

黃連酒炒

蒼朮已上各

右另秤一半為細

末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸一半以咀每服五錢水二盞先浸多半日煎至一盞去粗臨

卧熱服去枕仰臥每口作十次嚥之留一口送下丸藥服畢臥如常更以後藥塗之

龍泉散

龍泉粉炒

瓦粉

廣茂

京三稜酒洗

昆布已上各

右同為細末煎熟水調塗之用此藥去

疾尤速

救苦化堅湯

治瘰癧馬刀挾癭從耳下或耳後下頸至肩或入缺盆中乃手足少陽之經分其瘰癧

在頰下或至頰車乃足陽明之經分受心脾之邪而作也今將二證合而治之

黃芪壹錢

護皮毛間腠理虛及活血脉生血亦瘡家聖藥也又能補表實元氣之弱也人參分

補肺氣之藥也如氣短不調及喘者加之

炙甘草伍分

能調中和諸藥瀉火益胃氣亦能去瘡

邪真漏蘆

升麻已上各

葛根伍分

此三味俱足陽明本經藥也

連翹壹錢

此一味十

二經瘡中之藥不可無也能散諸血結氣聚此瘡家之神藥牡丹皮各分

去腸胃中留滯宿血

當歸身

生地黃

熟地黃已上各

此三味諸經中和血生血涼血藥也

白芍藥各分

如夏

月倍之其味酸其氣寒能補中益肺之虛弱治腹中痛必用之冬寒則不可用肉桂貳分

大辛

熱能散結積陰虛者須常用之此寒因熱用之意又為寒陰虛者其瘡用大辛熱以消浮涼之

氣如有煩躁者去之柴胡 五分功同連翹如瘡不在少陽經則去之桑枯子 五分無腫不

用羌活 五分獨活防風 五分此三味火關手足太陽經春痛項強不可迴視腰似折項

似拔者是也其心風一味辛溫若瘡在膈已上雖無手足太陽經證亦當用之為能散結去上部風

邪病人身拘急者風也昆布 五分其味大鹹若瘡堅硬結硬者宜用鹹能軟堅京三稜 五分

廣茂此二味若瘡堅硬甚者用之如不堅硬勿用五智仁 五分如唾多者胃不和也或

病人吐沫吐食胃土寒者加之無則去之大麥蘖 錢治腹中結急氣能消食補胃神龜

末炒黃色 二分為食不消化故也黃連 五分以治煩悶黃蘗 五分如有熱或腿脚無力如如

有躁煩欲去衣者腎中伏火也更宜加之無此證勿用厚朴 五分如腹脹者加之無則勿用

右為細末湯浸餅和丸如作餅子日乾搗如米粒大每服三錢白湯下如氣不順加橘皮其苦

如木香少許量病人虛實臨時斟酌與之無令藥多妨其飲食此治之大法也如止在陽明分為

療應者去桑胡桑枯子二味餘皆用之如在少陽分為馬刀扶腰者去獨活獨活升麻葛根更

加瞿麥穗三分如本人素氣弱其病勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜作氣盛而從病

變之權也宜加黃芩黃連黃蘗知母防己之類視邪氣在上中下三處假令在上焦加黃芩酒洗

一半生用在中焦加黃連一半酒洗 一半生用在下焦則加酒製黃蘗知母防己之類選而用之如本人大便不

通而滋其邪盛者加酒製大黃以利如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製大黃二味如風結燥

不行者加附仁大黃 如風澀而大便不行加煨皂角仁大黃秦芫以利之 如脉澀身有風澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥也 如陰寒之病為寒結閉而大便不通以局方中半硫丸或加煎附子乾薑求冷與之大抵用藥之法不惟瘡瘍一說諸疾病量人素氣弱者重寒之藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元氣餘皆倣此

柴胡連翹湯 治男子婦人馬刀瘡

中桂

當歸梢

五錢

秦梛子

炙甘草

酒黃蘗

生地黄

柴胡

黃芩

酒知母

連翹

五錢

瞿麥穗

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去渣稍熱食後服之

黍粘子湯 治耳痛生瘡

昆布

蘇木

生甘草

蒲黃

草龍膽

黍粘子

連翹

生地黄

當歸梢

黃芩

炙

甘草

黃連

柴胡

黃芪

桔梗

桃仁

紅花

少許

右剉如麻豆

大都作一服水二盞煎至一盞去渣稍熱食後服之寒藥利大便

淨液湯

一名連翹防風湯

治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

桂枝

連翹

生地黄

桔梗

升麻

甘草

當歸梢

七分

麻黃

草豆蔻仁

羌活

防風

柴胡

蒼朮

酒黃芩

一錢

紅花

少許

消腫湯

治馬刀瘡

黍粘子

黃連

當歸梢

甘草

瓜蒌根

黃芪

生黃芩

柴胡

以上各

生黃芩

柴胡

以上

各二 連翹 紅花 少許 右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去積稍飲食後服忌酒濕麵

內托羌活湯 治足太陽經中左右尺脈俱緊按之無力尻腎生癰堅硬腫痛大作

肉桂 三分 連翹 炙甘草 蒼朮 橘皮 各五分 當歸梢 防風 桑本 各一錢 黃芪 一錢 五分

黃蘗 酒製 羌活 三錢 右咬咀都作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗稍熱空心服以夾衣

蓋癰上使藥力行罷去蓋之木

升麻托裏湯 治婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脈弦洪按之細小

黃蘗 二分 肉桂 三分 黍粘子 五分 黃芪 炙甘草 當歸身 各一錢 連翹 升麻 葛根

錢五分 已上各一 右咬咀都作一服水一大盞酒半盞同煎至一盞去粗稍熱食後服

內托黃芪湯 賈德茂小男於左大腿近膝股內出附骨癰不辯肉色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大其左腳

乃肝之辭上也更在足厥陰肝經之分少侵足太陽脾經之分其脉左三部細而弦按之洪緩微有力此藥主之

生地黃 一分 黃蘗 一分 肉桂 三分 羌活 五分 當歸梢 各五分 土瓜根 酒製 柴胡梢 各一

錢 連翹 一錢 黃芪 二錢 右咬咀都作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗空心煎服

柴胡通經湯 治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡 連翹 當歸梢 生甘草 黃芩 黍粘子 京三棱 桔梗 各二分 黃連 五分 紅花

少許 右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去粗稍熱食後服忌苦藥泄大便

白芷升麻湯 尹老家素貧寒形志皆苦於手陽明大腸經分出癰幼小有癰疽其臂外皆腫痛在陽明

左右寸脉皆短中得之俱弦按之洪緩有力此雖得自八風之變以脉斷之邪氣在表其證大小便如故飲食如常腹中扣口知味知不在裏也不惡風寒止熱燥脉不浮知不在表也表裏既和邪氣在經脉之中內經云凝於經絡為瘡雖其雖出身早已上故風從上受之故知是八風之變為瘡者也故治其寒邪調其經脉中血氣使無凝滯而已

炙甘草 壹分 升麻 桔梗已上各伍分 白芷 桑分 當歸梢 生地黄已上各壹錢 生黃芩 伍分 酒

黃芩 連翹黃芪已上各貳錢 中桂 少許 紅花 少許 右咬咀分作二服酒水各一大盞半同煎

至一盞去粗稍熱臨卧服一服而愈

保生救苦散 治火燒或熱油烙及脫肌肉者

生寒水石 大黃火煨黃蘗油炒已上各等分 右為細末用油調塗之或乾用此藥塗之其痛立止日

近完從永無破傷風之患

一上散 治諸般疥癬必効

雄黃 通明子呼破者 黑狗脊 蛇床子 炒熟硫黃已上各伍錢 寒水石 陸錢 斑猫 拾分去翅足上研碎 右另研雄

黃硫黃寒水石如粉次入斑猫和蛇牀子黑狗脊為細末同研勻先洗疥癬令湯透去加油調手中

擦然以鼻中臭三兩次擦上可一上即愈如痛甚及腫滿高起者如寒水石一倍如不苦癢只

加黑狗脊如微癢只加蛇牀子如瘡中有蟲加雄黃如苦火灸湯浴者加硫黃

聖愈湯 治諸惡瘡血中多而心煩不安不得睡眠亡血故也以此藥王

生地黃 熟地黃 川芎 人參已上各 當歸身 黃芪已上各 右咬咀如麻豆大都作一服

水二大盞煎至一盞去粗稍熱無時服

獨聖散 治湯泡破火燒破瘡毒疼痛

生白礬 右為細末芝麻油調搗瘡破處不拘時候

黃芪肉桂柴胡酒煎湯 治附骨癰堅硬漫腫不辨肉色行步作痛按之大痛

黃芪 當歸梢已上各 柴胡錢 黍粘子炒 連翹 肉桂已上各 升麻藥分 炙甘草 黃

藥已上各 右咬咀好糯酒一大盞半水一大盞半同煎至一大盞去粗空心溫服少時便以早飯

壓之不致大熱上攻中上二焦也

雜病門

安神丸 治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊懷之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不安宜

用權衡法以鎮陰火之浮越以養上焦之元氣經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去

心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血為臣以當歸補血不足以硃砂納浮留

之火而安神明也

黃連壹錢伍分酒洗 硃砂壹錢水飛 酒生地黃 酒當歸身 炙甘草已上各 右件除硃砂水飛外搗四

味為細末同和勻湯浸餗餅為丸如黍米大每服十五丸津嚥下食後

硃砂安神丸 治心煩懊懷心亂怔忡上熱胸中氣亂心下痞悶食入反出

硃砂 肆錢

黃連 伍錢

右為末湯浸餗餅為丸如黍米大每服十九丸食後津唾嚥下

補氣湯 治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

白芍藥

橘皮 不去白各壹兩伍錢

炙甘草

黃芪 已上各壹兩

澤瀉 伍錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至

盞去粗溫服

當歸補血湯

治婦人肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脉洪大而虛重按全無內經曰脉虛

血虛脉實血實又云血虛發熱證象白虎惟脉不長實為辯也若誤服白虎湯必死此病得之於肌困

勞役

黃芪 壹兩

當歸身 酒製錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱空心服

柴胡升麻湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋骨熱表熱如火燎以手捫之烙人手夫四肢者屬脾土也

熱伏地中此病多因血虛而得之又有胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中此藥主之

升麻

葛根

獨活

羌活

白芍藥

人參 已上各伍錢

炙甘草

柴胡 已上各三錢

防風 二錢伍分

生

甘草 二錢

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗熱服忌寒冷之物

火鬱湯

治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱

則發之

升麻

葛根

柴胡

白芍藥 已上各壹兩

防風

甘草 已上各伍錢

右咬咀每服五錢水二大盞入連翹

蔥白三寸煎至一盞去粗稍熱不拘時候服

小黃丸 化痰涎和胃氣除濕治胸中不利

黃芩 一兩

半夏

湯薑

白朮

已上各

陳皮 青皮 去白

黃芪

已上各

澤瀉 二錢

乾薑 錢

分伍

右為末湯浸餅為丸如菜豆大每服五十丸食遠溫水下

黃芩 利膈丸

除胸中熱利膈上疾

生黃芩

炒黃芩

已上各

半夏

黃連

澤瀉

已上各

南星

枳殼

陳皮

已上各

白朮

二錢

白礬 伍分

右為末湯浸餅為丸如梧桐子大每服三五十丸食遠溫水下忌酒濕麵

補益腎肝丸

治目中流火視物昏花耳聾耳鳴困倦乏力寢汗惡風行步不正兩足軟側臥而多發熱

膝無力腰以下消瘦

柴胡

羌活

生地黃

苦參 炒

防己

已上各

附子

肉桂

已上各

當歸身

二錢

右為細

末熟水為丸如雞頭仁大每服五十丸食前溫水下

太陽經聖藥

防風

二分

羌活

三分

紅豆

二箇

右為細末鼻內噴之

麻黃 桑葉湯

治胸中痛頭痛食減少咽嗑不利右寸脉弦急

麻黃

羌活

已上各

吳茱萸

黃芪

升麻

已上各

黃芩

當歸

黃蘗

蒙本

已上各

川

芎藭

荊子

柴胡

蒼朮

黃連

半夏

已上各

細辛

少許

紅花

少許

右剉如麻豆大

黃芪湯 治表虛惡風寒

黃芪 伍錢

甘草 三錢

香白芷 二錢五分

藁本

升麻 已上各二錢

草豆蔻

橘皮 已上各一錢五分

麻黃

當歸身 已上各一錢

蓮花青皮 七分

柴胡 六分

黃藥 少許

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去

粗不拘時服

濕補氣湯 一名清神補氣湯

治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉

洪大

升麻 六錢

蒼朮 四錢

酒黃藥

柴胡

黃芪 已上各三錢

酒知母

藁本

生甘草

當歸 已上各二錢

錢

五味子 陳皮 已上各錢五分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗空心服之待少時

以早飯下之

參歸湯 補氣血俱不足

黃芪 十分

甘草

生地黃 已上各伍分

柴胡

草豆蔻仁

升麻 已上各四分

當歸身 三分

熟地黃

人參 已上各三分

益智仁 少許

紅花 少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠

服

升陽湯

治陽踰痼疾足太陽經寒熱則氣下行宜升陽氣

炙甘草 伍錢

麻黃 不去節

防風 已上各八錢

羌活 壹兩伍錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗

稍熱空心服

自汗門

自汗論

或問濕之與汗為陰乎為陽乎曰西南坤土也在人則為脾胃也人之汗猶天地之雨也陰濕其濕則為霧露為雨也陰濕下行地之氣也汗多則亡陽陽去則陰勝也甚為寒中濕勝則音聲如從釜中出濕若中水也相法家有說土音如居深室裏言其壅也遠近不出也以明其濕審矣又知此二者亦為陰寒也內經云氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中表虛亡陽不任外寒終傳寒中多成痺寒矣色以候天脉以候地形者乃候地之陰陽也故以脉氣候之皆有形無形之可見者也

調衛湯 治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒

黃芪

麻黃根

已上各壹錢

羌活

桑分

生甘草

當歸梢

生黃芩

半夏

薑製已上

麥門冬

生地

黃芪

已上各壹分

猪苓

貳分

蘇木

紅花

已上各壹分

五味子

桑箇

右劉如麻豆大都作一服水二盞煎

至一盞去粗稍熱服

中風證必自汗不得重發其汗

清燥湯

治六月七月間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合必利庚大腸寒冷以救之燥金受濕

熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰膝下痿軟癱瘓不能動行步不正兩足軟側此藥主之

黃芪

壹錢

橘皮

白木

澤瀉

已上各伍分

人參

白茯苓

升麻

已上各參分

炙甘草

麥門冬

當歸身

生地黃

神麴末

猪苓

已上各貳分

柴胡

酒黃蘗

黃連

蒼朮

已上各壹分

五味子

改

右劉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗空心熱服

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也

當歸 生地黃 熟地黃 黃蘗 黃芩 黃連已上各等分

益煎至一盞食前服小兒減半服之

紅豆散 治頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根炒伍錢 苦丁香伍分 羌活炒 連翹炒已上各等分 紅豆拾箇 右為細末鼻內噓之

治血通經湯 靈壽縣董監軍癸卯冬大雪時因事到真定忽覺有風氣暴至診候得六脉俱弦其按之

洪實有力其證手攣急大便秘澀而赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搖

急而攣痺乃風淫木疾而寒在外也內經曰寒則筋攣止謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之

間故大便秘澀而面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒

邪而緩其急搖又以黃蘗之苦寒滑以瀉實而潤燥急發腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之

經不令過絕更以桂枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪

而退木邪專益肺金也加人參以補元氣為之輔佐加當歸身去瘀急而和血潤燥此藥主之

芍藥伍分 升麻 葛根 人參 當歸身 炙甘草已上各壹錢 酒黃蘗 桂枝已上各貳錢 右剉如

麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞熱服不拘時令暖房中近火摩挲其手

瀉藥湯 治癰風滿面連頭極癢不任眉毛脫落先破其處令惡氣消盡後服此藥

連翹 升麻已上各壹分 桔梗伍分 生黃芩 生地黃已上各壹分 黃芪 蘇木 黃連 地龍 全蠍

當歸已上各三分

白豆蔻

人參已上各貳分

甘草一分

梧桐淚一分

麝香少許

桃仁三箇

五

蟲去翅足炒三箇

水蛭冬箇炒令烟盡

右剉如麻豆大除連翹梧桐淚白豆蔻另為細末麝香粟泔水蛭三味

同為細末都作一服水二盞酒一盞入連翹煎至一盞去粗再入白豆蔻二味并麝香等再煎至七分稍熱早飯後午前服之忌酒濕麵生冷硬物

人參益氣湯 治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜臥乃熱傷元氣也

黃芪捌錢

生甘草

人參已上各伍錢

白芍藥叁錢

柴胡貳錢伍分

炙甘草

升麻已上各貳錢

五味

子壹百肆拾箇

右咬咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服

導氣湯 治兩腿麻木沉重

黃芪捌錢

甘草陸錢

青皮肆錢

升麻

柴胡

當歸梢

澤瀉已上各貳錢

橘皮壹錢

五味子壹百貳拾箇

右咬咀分作四服每服水二大盞煎至一盞去粗食前熱服

補中湯 治面黃汗多目赤四肢沉重減食腹中時時痛咳嗽兩手寸脉短右手脉弦細兼澀關脉虛

升麻

柴胡

當歸已上各貳分

神麴叁分炒

澤瀉肆分

大麥藥麵

蒼朮已上各伍分

黃芪貳錢伍分

炙甘草捌分

紅花少許

五味子貳拾箇

右咬咀分作二服水二盞煎至一盞去粗食遠服

麻黃蒼朮湯 治秋冬每夜五更嗽連聲不絕乃至天曉日高方緩口苦兩脇下痛心下痞悶臥而多驚

筋攣肢節痠痛痰涎沫白晚神昏呵欠不進飲食

麻黃捌錢

蒼朮伍錢

黃芪壹錢伍分

草豆蔻陸分

柴胡

羌活已上各伍分

生甘草

當歸梢

防風已上各肆分

炙甘草 黃芩已上各叁分

五味子玖箇

右咬咀分作二服水二盞煎至一盞稍熱

臨臥服

上清湯 清利頭目寬快胸膈

人參 蔓荊子已上各伍分 防風壹錢

葛根壹錢伍分 黃芪叁錢

甘草肆錢

右咬咀分作二服水二

盞煎至一盞去粗臨臥熱服以夾衣蓋覆不語須臾汗出為効

术桂湯一名麻黃蒼朮湯

治寒濕所客身體沉重胃脘痛面色痿黃

蒼朮貳錢

麻黃 炒神麴

橘皮 白茯苓

澤瀉已上各壹錢

桂枝

半夏

草豆蔻仁

猪苓

已上各五分

黃芪叁分

炙甘草貳分

杏仁拾箇

右都作一服水二盞生薑五片煎至一盞去粗

食前熱服

正氣湯 治盜汗

炒黃蘗 炒知母已上各錢伍分

炙甘草伍分

右為麤末作一服水二盞煎至一盞食前溫服

越痛丸 治打撲閃損腰痛不可忍

白葛苳子壹兩炒黃 烏梅壹箇

白粟米一錢炒黃

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒空

心下

退熱湯 治表中虛熱或遇夜則甚

黃芪壹錢 柴胡柒分

生甘草

黃連酒製

黃芩

芍藥

地骨皮

生地黄去血

蒼朮

已上

各五 當歸身 升麻 以上各三分 右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗食遠溫服 如身體力困

者加麥門冬五味子 已上各五分 人參甘草 已上各壹錢

解表升麻湯 治遍身壯熱骨節疼痛

升麻 羌活 蒼朮 已上各壹錢 防風 捌分 柴胡 甘草 已上各柒分 當歸 薑本 已上各伍分 橘皮 叁分

冬加麻黃 節不去 春加麻黃 去節 右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗溫服後以蔥醋湯發之

得微汗為効

天麻黃芪湯 治表有風證因連日酣飲其證復來右口角并眼頗有側視及左手左腳腿麻木疼痛

天麻 芍藥 神麴 炒 羌活 肢節不痛去之 茯苓 已上各叁分 人參 黃連 已上各肆分 當歸 伍分 黃芪

甘草 升麻 葛根 黃蘗 蒼朮 已上各陸分 澤瀉 柒分 柴胡 玖分 右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗食遠溫服或加猪苓 陸分

健步丸 治膝中無力伸而不得屈屈而不能伸腰背腿膝沉重行步艱難

防己 酒洗壹兩 羌活 柴胡 滑石 炒 炙甘草 瓜蒌根 酒洗已上伍錢 澤瀉 防風 已上各叁錢 苦參 酒洗

川烏 已上各壹錢 肉桂 伍分 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九煎愈風湯下空心服

白朮除濕湯 治午後發熱背惡風四肢沉重小便或多或少黃色此藥又治汗後發熱

白朮 壹兩 生地黃 炒 地骨皮 澤瀉 知母 已上各柒錢 赤茯苓 人參 炙甘草 柴胡 已上各伍錢

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠溫服 如小便快利減茯苓澤瀉一半 如

有刺痛一料藥中加當歸身酒洗

加味四君子湯 治久瘧熱多寒少不止

白朮 白茯苓 人參 甘草 柴胡 薄荷 黃芩已上各等分 右咬咀每服五錢水二盞生姜

三片棗一枚煎至一盞去粗不拘時候服

瀉血湯 治發熱晝少而夜多太陽經中尤甚晝病則在氣夜病則在血是足太陽膀胱血中浮熱微有

氣也既病人大小便如常知邪氣不在臟腑是無裏證也外無惡寒知邪氣不在表也有時而發有時

而止知邪氣不在表不在裏知在經絡也夜發多而晝發少是邪氣下陷之深也此雜證當從熱入血

室而論之

生地黄酒洗 熟地黄 蒲黃 丹參酒炒 當歸酒洗 漢防己酒洗 柴胡去芦 甘草梢炙

羌活已上各壹兩 桃仁去皮杏仁錢湯浸 右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗空心溫服

洗面藥 治面有黥黯或生瘡或生疼痛及粉刺之類并去皮膚燥癢去垢膩潤澤肌膚

皂角叁斤去皮另搗 好升麻剉兩 楮實子伍兩 白芨壹兩 甘松壹兩 縮砂連皮 白丁香臘月

三奈子已上各五分 萊豆剉合揀淨 糯米壹升 右為細末用之如常

瑩肌如玉散 白丁香 白芨 白牽牛 白欬已上各壹兩 白芷壹兩 當歸梢 白茯苓 升麻已上各五錢

錢 白茯苓 楮實子已上各壹錢 麻黃去節 白附子 連翹已上各壹錢伍分 小椒壹錢 右為細末用

之如常

面油厚風膏

麻黃

升麻

去黑皮

防風

已上各

羌活

去皮

當歸身

白芨

白檀

已上各

右用小油半斤

以銀器中熬綿定前藥於油中熬之得所澄淨去粗入黃蠟一兩再熬之為度

小兒門

治驚論

外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥必殺人何也
辛散浮溫熱者火也能令母實助風之氣盛皆殺人也因驚而泄青色先鎮肝以硃砂之類勿用寒涼之
氣大禁涼驚丸風木旺必克脾胃當先實其土後瀉其木關孝忠編集錢氏方以益黃補土誤矣其藥有
丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾胃當瀉子今脾胃虛反更瀉
子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關脉洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來
乘脾土其病嘔吐腹痛瀉劑青白薑散聖藥也今立一方先瀉火補金然後再大補其土是為神治之
法

黃芪湯

黃芪

氣錢

人參

壹錢

炙甘草

五分

右以咀作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠服加

白芍藥尤妙

此三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸

寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位大旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之

邪大益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕大盛神品之藥也若得脾胃中伏熱火鬱役不足

之證及服熱藥已豆之類皆虛而成慢驚之證用之必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也
錢氏以羌活膏療慢驚風誤矣脾虛者由火邪乘其土位故曰從後來者為虛邪火旺能實其木木旺
故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒更於脾土中補金以酸涼致脾土中
金旺火衰風木自虛矣損食多進藥愈前藥是也

益黃散 治胃中風熱

黃芪

陳皮

人參

芍藥

生甘草

熟甘草

黃連

右

為細末每服二錢水一盞煎至五分食前服

升陽益血湯 二月間有一小兒未滿一百日病腹脹二日大便一度瘦弱身黃色宜升陽氣滋血益血

補血利大便

蠟梢

神麴末

升麻

當歸

厚朴

桃仁

右都作一服水一大盞煎

至半盞去粗食遠服

厚腸丸 治小兒失乳以食飼之未有食腸不能化或生腹脹四肢瘦弱或刺色無常

厚朴

青皮

橘紅

半夏

蒼朮

人參

枳實

麥蘖麵

神麴末

右為極細末水煮麵糊為丸如麻子大每服二十丸溫水送下食前忌飽食

補陽湯 時初冬一小兒二歲大寒證明堂青脉額上青黑腦後青絡高起舌上白滑喉鳴而喘大便微

青耳尖冷目中常常淚下仍多胸中不利臥而多驚無搖則寒

黃蘗 橘皮 葛根 連翹 蠟精 炙甘草已上各五分 升麻 黃芪 柴胡已上各五分 當歸身

麻黃已上各五分 吳茱萸 生地黃 地龍已上各五分 右吹咀都作一服水一大盞半煎至六分去粗

乳食後熱服服藥之後添喜笑精神出氣和順乳食旺

大蕪荑湯 一名梔子茯苓湯 治黃疸土色為熱為濕常小便不利今反利知黃色為燥胃經中大熱髮

黃脫落知膀胱與腎俱受土邪乃大濕熱之證鼻下斷作瘡者上逆行榮氣伏火也能乳者胃中有熱

也寒則食不入喜食土者胃不足也面黑色者為寒為痺大便青寒褐色血黑色熱畜血中問黃色腸

中有熱治法當滋榮潤燥除寒熱致津液

防風 黃連已上各壹分 黃蘗 炙甘草 麻黃不去根節 羌活已上各貳分 山梔子仁 柴胡 茯苓已上各壹分 當歸肆分 大蕪荑 白朮已上各伍分 右剉如麻豆大都作一服用水一大盞半煎至六分

去粗食前稍熱服

增氣退黃湯 一名茯苓滲濕湯 治小兒面色痿黃腹脹食不能下

白朮 柴胡已上各半分 升麻壹分 桂枝 麻黃 吳茱萸 厚朴 羌活 草豆蔻 神麴末

蒼朮 澤瀉 白茯苓 猪苓 黃蘗 橘紅已上各貳分 青皮 黃連已上各伍分 杏仁貳箇 右都

作一服水二大盞煎至一盞去粗食前溫服

中滿分消丸

枳實 黃連去霜 厚朴已上各伍分 生薑 薑黃 猪苓已上各壹錢 橘皮 甘草 白朮已上各壹錢

砂仁 澤瀉 茯苓 已上各參錢 半夏 肆錢 黃芩 壹兩貳錢 右為細末湯浸証餅為丸如黍米大母服

三十九丸溫水下

消痞丸

黃連 伍錢 黃芩 貳錢 厚朴 柒分 薑黃 伍分 乾生薑 人參 已上各肆分 甘草 叁分 枳實 貳分

橘皮 壹分 右為細末湯浸証餅為丸如黍米大母服三十丸隨乳下

癰疹論

夫癰疹始出之證必先見面燥腮赤目胞亦赤呵欠煩悶乍涼乍熱嗽嗽嚏嚏是稍冷多睡驚並瘡疹之證或生膿胞或生小紅癰或生癰疹此二等不同何故俱顯上證而後乃出蓋以上諸證皆太陽其水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽內火不得傳導逆於面上故顯是證蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸癰證皆從寒水逆流而作也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門主男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子三日四日五日血脉已旺精不勝血則為女子二物相搏長生先身謂之神又謂之精道釋二門言之本來面目是也其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神饑則食母血渴則飲母血兒隨日長皮肉筋骨血脉形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻於一隅伏而不發直至因內傷乳食濕熱之氣下流合於腎中二火交攻致營氣不從逆於肉理惡血

乃發諸斑疹皆出於膀胱壬水其場後聚肉理歸於陽明故三番斑始顯之症皆足太陽土膀胱過內小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水通身俱出此皆出從足太陽傳變中來也當外發寒邪使令消散內瀉二火不令其攻其中令濕氣上歸復其本位可一二服立已仍令小兒以後再無二番斑出之患此內經之法覽者詳之

消毒救苦散 治斑證悉具消化便令不出如已出布者再不生斑

防風 羌活 麻黃根 升麻 生地黃 連翹 初出者減 出大者加 酒黃蘗 已上各 伍分 當歸身 黃連 已上各 伍分

各卷 川芎 藁本 柴胡 葛根 酒黃芩 生黃芩 蒼朮 已上各 貳分 細辛 生甘草 白木

陳皮 蘇木 紅花 已上各 壹分 吳茱萸 半 分 右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去粗

稍熱空心服

夫斑疹出者皆因內傷必出斑營氣逆故也夫大寒牽牛已豆食藥宜以半夏枳木大黃益智仁之類去其泄瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚寢噴眼澀知必出斑也諸大膿泡小水泡斑疹癰三色皆營氣逆而寒復其表宜以四味升麻湯中加當歸身連翹此定法也

如肺成膿斑先嗽喘或氣高而喘促加人參少加黃芩以瀉伏火而補元氣 如心出小紅斑必先見噤乾驚悸身熱肌肉腫脉弦洪少加黃連 如命門出癰疹必先骨疼身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃又加黃蘗諸斑疹皆為陰證瘡須皆因內傷飲食脾胃不足營氣逆行雖大熱內熾陰覆其外治法

如前

辯小兒痘證

呵欠 嚏噴 睡中發驚 或耳尖冷 眼澀

或辯復食

口熱 或口醋氣 奶辦不消 或腹中痛

如痘證少具其痘未發乃與升麻湯三五錢帶熱服之待身表溫和痘疹已顯服藥乃止 如其身涼其痘未出辯得是痘證無問服數直候身表溫和及痘瘡已顯然後乃止 只時時與桔梗湯寬胸膈利咽喉

桔梗湯 如痘已出只時時與之快咽喉寬利胸膈

桔梗 貳錢 甘草 主錢

右為麤末每服三錢水一大盞煎至六分去粗大溫時時服之不可計服

數 如見傷食證又見痘證先與不犯大黃巴豆藥剋化過再與升麻湯 如食重傷前藥不能過再與犯大黃巴豆藥過 如大便秘行當即便與升麻湯服之恐痘子內陷已後臨時作罪過 如痘子已出稠密身表熱急與下項

黍粘子湯 如痘子已出稠密身表熱急與此藥服之防後青乾黑陷

黍粘子 炒香

當歸身 酒洗

炙甘草 已上各壹錢

柴胡 連翹

黃芪

黃芩

已上各壹錢伍分

地骨皮 已上

各貳錢

右同為麤末每服二錢水一大盞煎至六分去粗溫服腹空服藥畢日休與乳食

麻黃柴胡升麻湯

治小兒寒鬱而喘喉鳴腹中鳴腹滿鼻流清涕脉沉急而數

麻黃

草豆蔻仁

益智仁已上各錢伍分

吳茱萸

厚朴已上各貳分

當歸稍

甘草

柴胡

生黃芩

已上各壹分

升麻

神麴


蘇木已上各半分


全蠍

紅花貳箇少許

右剉如麻豆大分作二服水一

大盞煎至七分食遠服忌風寒微有汗則効





L6932

1907

v. 2